Édition 2012

Catalogue DESCRIPTIF DES PRODUITS

Pour usage professionnel seulement

-Heel

Édition 2012

Catalogue DESCRIPTIF DES PRODUITS

Heel Canada Inc.
11025 L.-H. Lafontaine
Montréal, Québec
Canada, H1J 2Z4

Tél. : 514 353-4335 | 1 888 879-4335
Téléc. : 514 353-4336 | 1 877 353-4336
info@heel.ca | **www.heel.ca**

Heel

© 2011, Heel Canada Inc.
Montréal, Québec, Canada
Imprimé au Canada

Table des matières

Préface 5-6

A Introduction

1.1 Information générale 9-10

1.2 Mode d'emploi 10-11

1.3 Choix des préparations appropriées 11

1.4 Information sur les allergies 12-13

1.5 Traitement des cas dont la progression est inhabituelle 13-14

1.6 Durée de conservation et entreposage des préparations Heel 15

B Référence : indication

Suggestions thérapeutiques 19-47

C Référence : description des produits

1 Préparations complexes antihomotoxiques 51-125

2 Préparations Injeel[MD] et Injeel[MD] forte – Médicaments unitaires homéopathiques en accords de dynamisation 127-145

D Index : produits 147-152

Vivez sans douleur

Soulagez la douleur et l'inflammation associées aux blessures : entorses, dislocations, contusions

Traumeel[MD] S a démontré scientifiquement qu'il soulageait la douleur musculaire, les ecchymoses et l'inflammation associées aux blessures telles que les entorses et les contusions, de même que les douleurs articulaires.

Quelques produits complémentaires pour la douleur musculaire et articulaire :

- Zeel®
- Spascupreel®
- Neralgo-Rhem-Injeel®
- Colocynthis-Homaccord®
- Ferrum-Homaccord®

www.heel.ca
www.traumeel.com

Heel

Préface

Heel au Canada

La gamme des préparations Heel mises en marché au Canada résulte de plus de 75 ans d'expérience acquise dans le domaine de la médecine antihomotoxique par Heel en Allemagne et à travers le monde. Les formulations sont fondées sur les préceptes de l'homotoxicologie développés par Dr Hans-Heinrich Reckeweg, qui a associé avec brio les principes de l'homéopathie à ses connaissances approfondies de la médecine conventionnelle. Ces formulations favorisent l'action concertée et optimale des substances individuelles présentes dans les préparations, et activent en synergie les pouvoirs d'auto-guérison de l'organisme.

Partenaires de la médecine intégrative

Les préparations sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont utilisées par des praticiens en soins de santé qui ont le désir de proposer à leurs patients les avantages de la médecine intégrative. Ils ont désormais la possibilité de le faire grâce aux descriptions détaillées de ces préparations spécialement fabriquées. De plus, les praticiens en soins de santé peuvent faire appel à l'expérience des spécialistes du Département scientifique de Heel afin d'obtenir l'information dont ils ont besoin pour le traitement d'un patient donné. Les utilisateurs des préparations Heel ont également accès au matériel bibliographique sélectionné et aux résultats d'un grand nombre d'analyses de pharmacovigilance et autres études reconnues.

À retenir

Grâce à leur formulation homéopathique, les préparations de Heel s'avèrent d'une grande efficacité dans le traitement des troubles aigus aussi bien que chroniques. En outre, elles peuvent être administrées avec succès en traitement préventif. Toutefois, les préparations homéopathiques ne sont pas indiquées pour le traitement des patients en phase critique.

Une aggravation initiale temporaire des symptômes peut survenir au début du traitement. Cependant, en général, de telles réactions montrent le début de l'efficacité d'un produit choisi judicieusement, et il est rarement nécessaire d'interrompre un tel traitement. Pour le praticien homéopathique, de telles réactions sont le signe certain qu'il ou elle a choisi correctement le médicament administré, mais que le dosage est peut être à modifier.

Les préparations Heel aident l'organisme dans ses efforts vers le retour à la santé en activant ses forces intrinsèques d'auto-guérison. Le processus de sélection des constituants homéopathiques permet au praticien en soins de santé d'atteindre l'objectif de toute thérapie médicamenteuse : un traitement spécifique sans effet secondaire.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

L'information contenue dans ce document est destinée à un usage professionnel seulement et ne prétend pas permettre le diagnostic ou le traitement de maladies, ni remplacer un avis médical. Heel n'acceptera aucune responsabilité médicale ou légale liée à la mauvaise interprétation ou mauvais usage du contenu informatif et éducationnel du présent document.

Introduction

A

1.1 Information générale

Règle générale, pour tous les produits, il est mentionné sur l'emballage :

- Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé.
- Consultez un praticien en soins de santé avant d'utiliser tout médicament si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Gardez hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.

Le signe suivant ø veut dire teinture mère i.e. si ce caractère est placé à côté du nom d'un ingrédient médicinal, cet ingrédient médicinal est incorporé au produit au niveau de la teinture mère.

INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS MÉDICINAUX :

Les ingrédients médicinaux de chacune des préparations homéopathiques sont détaillés à l'intérieur du texte. Pour obtenir de l'information relative à la source de ceux-ci, il sera possible d'accéder un lien sur le site web de Heel (www.heel.ca) vers la base de données d'ingrédients de produits de santé naturels de la Direction des Produits de Santé Naturels. À cet endroit, vous trouverez les informations relatives à la source de chaque ingrédient homéopathique. En attendant le complétage de cette base de données, si vous avez besoin d'obtenir de l'information relative à la source des ingrédients, svp contacter notre département du service à la clientèle.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX :

- **Sirop contre la toux** (Brocosin®) : propylène glycol, méthyl paraben, propyl paraben, sucrose, miel d'Acacia, arôme naturelle de citron, éthanol, eau purifiée.
- **Gouttes :** éthanol, eau purifiée. Le pourcentage d'alcool spécifique à chaque préparation est indiqué à l'intérieur du texte. Toutes les gouttes contiennent une certaine quantité d'alcool. Ces médicaments sont préparés dans des solutions aqueuses à base d'alcool en conformité avec les directives de fabrication de la Pharmacopée homéopathique allemande (HAB). Veuillez consulter les descriptions individuelles des produits pour connaître la quantité exacte d'alcool dans la composition de chacune des préparations offertes sous forme de gouttes. Habituellement, la quantité d'alcool est négligeable, c'est-à-dire qu'une dose de 10 à 15 gouttes peut contenir aussi peu d'alcool (0,13 – 0,45 g) qu'on en trouve naturellement dans une tranche de pain (0,1 – 0,2 g) ou un demi-verre de jus de pomme (0,5 g). Considérant le taux de dégradation naturelle de 0,09 – 0,13 g d'alcool par kg/jour, il ne faut que de 1 à 5 minutes à l'organisme humain (de 60 kg) pour éliminer cet alcool. Quoi qu'il en soit, la prudence est de mise lorsque ces médicaments sont prescrits à des patients pour qui même une très faible quantité d'alcool peut encourager l'apparition de troubles, par exemple les personnes souffrant d'une hépatopathie ou d'une dipsomanie et plus particulièrement encore, les alcooliques ayant cessé de consommer.

:: **Gouttes ophthalmiques :** chlorure de sodium, phosphate de sodium dibasique (dihydrate), phosphate de sodium monobasique (dihydrate), eau purifiée.
:: **Gel :** carbomère 940, solution d'hydroxyde de sodium 18 % (m/m), eau purifiée, éthanol.
:: **Vaporisateurs nasaux :** chlorure de benzalkonium (N.B. pas dans la formule d'Euphorbium comp. SN), phosphate de sodium monobasique (dihydrate), phosphate de sodium dibasique (dihydrate), chlorure de sodium, eau purifiée.
:: **Pommade :** éthanol, eau purifiée, alcool cétostéaryle, huile minérale lourde, pétrolatum blanc.
:: **Ampoules buvables stériles :** eau purifiée, chlorure de sodium.
:: **Comprimés :** stéarate de magnésium, monohydrate de lactose. Les comprimés contiennent du lactose, soyez prudent si vous souffrez d'une intolérance au lactose. Dans les cas rares des patients qui souffrent d'intolérance au lactose, les préparations en comprimés ne doivent être prescrites que sous toute réserve. Ces préparations ne sont pas contre-indiquées pour le traitement du diabète sucré. Pour les formes graves de cette maladie, où un régime strictement contrôlé quant à l'apport de glucides (hydrates de carbone) doit être observé, il faut calculer une quantité de 0,3 g (300 mg) de sucre par comprimé (300 mg).
:: **Suppositoires** (Viburcol® N) : gras solide NF.

1.2 Mode d'emploi

Tous les produits comportent une posologie générale. Beaucoup d'entre eux affichent également un dosage aigu pour les groupes d'âges pour lesquels ils sont destinés. Ces dosages sont des lignes directrices qu'un praticien en soins de santé expérimenté peut suivre ou ajuster. Pour cette raison, sur l'emballage de nos produits, il est toujours indiqué dans la section de dosage ***« Autrement, utiliser selon l'avis d'un praticien d'homéopathie ou d'un médecin ».***

Les produits affichant des dosages pour une utilisation chez les bébés indiqueront que le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés. Dans le cas des produits affichant des dosages pour une utilisation dans les groupes d'âges plus vieux que les bébés, il est indiqué que le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés. Cette façon de faire assure qu'un praticien en soins de santé est impliqué lorsque les produits seront utilisés chez les bébés, particulièrement dans les cas où aucun dosage pour bébés n'est disponible sur l'étiquette.

- Dans le cas des liquides (gouttes, ampoules buvables) : verser dans une petite quantité d'eau, boire lentement, garder en bouche avant d'avaler.
- Pour les comprimés : laisser dissoudre lentement dans la bouche. Dissoudre le comprimé dans une cuillerée à thé d'eau avant d'administrer à un jeune enfant ou à un bébé, le cas échéant.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES :

:: **Gouttes :** protéger de la chaleur. Fermer la bouteille immédiatement après usage.
:: **Vaporisateurs nasaux :** protéger de la chaleur. Fermer le vaporisateur-doseur immédiatement après usage.
:: **Sirop :** garder hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.
:: **Pommade, gel, vaporisateur pour la bouche et la gorge** (Vinceel[MD]) **:** protéger de la chaleur.
:: **Comprimés :** protéger de la chaleur et de l'humidité. Fermer le contenant immédiatement après usage.
:: **Ampoules buvables stériles :** protéger de la lumière directe du soleil.
:: **Ampoules** (Traumeel[MD] s gouttes otiques, Oculoheel[MD] gouttes ophtalmiques, Viburcol[MD] monodoses) **:** protéger de la lumière directe du soleil. Entreposer dans un endroit frais et sec.
:: **Suppositoires** (Viburcol[MD] N) **:** ne pas exposer à des températures supérieures à 30°C, même pour une courte période de temps puisque les suppositoires pourraient amollir et fondre.

1.3 Choix des préparations appropriées

En règle générale, la procédure suivante doit être observée lors du choix des préparations appropriées à l'application thérapeutique.

Lorsque le présent catalogue descriptif des produits précise le nom d'un médicament dont les indications correspondent exactement à un syndrome donné ou dont la pathogénésie homéopathique des ingrédients correspond exactement à la symptomatologie du patient, le médicament en question doit être le principal agent thérapeutique. En présence de symptômes multiples ou pour les cas où il est difficile de déterminer facilement le médicament approprié, le choix doit être effectué en fonction des symptômes; par conséquent, il est parfois nécessaire de recourir à plusieurs préparations pour répondre aux différents besoins. Ainsi, des médicaments peuvent être administrés simultanément pour soulager les céphalées, les troubles cardiaques, la stase veineuse, l'arthralgie, etc.

Lorsque plusieurs préparations sont prescrites simultanément, elles peuvent être prises séparément (en alternance, à des intervalles d'une ou deux heures) ou encore, être prises ensemble. À ce jour, aucun changement dans l'efficacité des préparations n'a été observé avec leur prise simultanée. Quand des préparations sont disponibles sous plusieurs formes (par exemple, en gouttes et en comprimés), **elles sont généralement équivalentes du point de vue de l'action thérapeutique**.

1.4 Information sur les allergies

:: ALCOOL

Toutes les préparations en gouttes de Heel contiennent de l'éthanol en quantité variée. Veuillez consulter les descriptions individuelles de chaque produit pour plus de détails.

:: COLORANTS ARTIFICIELS

Les préparations Heel ne contiennent aucun colorant artificiel.

:: GLUTEN

Hepar comp. Heel (ampoules buvables), Neurexan (comprimés et gouttes), Neuro-Heel (ampoules buvables), et Valerianaheel (gouttes) contiennent de faibles quantités de gluten en raison de la présence de l'ingrédient médicinal Avena sativa (avoine).

L'éthanol contenu dans nos produits sous forme de gouttes est une autre source de gluten parce qu'il est fabriqué à partir de betteraves, de fruits ou de céréales. Lorsque les céréales sont utilisées il y a la possibilité de présence de gluten. Par contre l'éthanol utilisé est de qualité pharmaceutique et la méthode de fabrication utilisée assure qu'il n'y aura qu'une présence négligeable de gluten.

:: GLYCÉROL

Le glycérol est contenu dans Vinceel[MD] et dans les teintures mères de Lachesis mutus, Vipera berus, tous les ingrédients d'organes suis et tous les nosodes.

Donc, de faibles quantités de glycérol sont aussi contenues dans les préparations complexes contenant un ou plusieurs de ces ingrédients.

:: CHLORURE DE BENZALCONIUM

Le vaporisateur nasal Luffa comp.-Heel et le vaporisateur nasal Euphorbium compositum contiennent 0,01 % de chlorure de benzalconium. (Notez que le vaporisateur nasal Euphorbium compositum SN n'en contient pas.)

:: MAÏS

Les préparations Heel ne contiennent aucun ingrédient à base de maïs.

:: LACTOSE

Toutes les préparations en comprimés de Heel contiennent 300 mg de lactose (sucre de lait).

:: STÉARATE DE MAGNÉSIUM

Toutes les préparations en comprimés de Heel contiennent du stéarate de magnésium.

:: PROTÉINES VÉGÉTALES

Presque toutes les préparations contiennent des extraits de plantes en potentialisation et, par conséquent, elles contiennent également des protéines végétales (sous forme non hydrolysée). Veuillez consulter les descriptions individuelles de chaque produit qui indiquent les sources végétales faisant partie de chacune des préparations.

:: SOYA
Les préparations Heel ne contiennent pas d'ingrédients à base de soya.

:: SUCRE (SACCHAROSE)
Les préparations Heel à l'exception de Brocosin (sirop) ne contiennent pas de sucre/saccharose. Tous les comprimés contiennent du lactose (sucre de lait).

:: LEVURE
Les préparations Heel ne contiennent pas d'ingrédients à base de levure.

1.5 Traitement des cas dont la progression est inhabituelle

Dans certains cas, il arrive que la prise initiale de préparations homéopathiques entraîne une légère aggravation de symptômes, une réaction excessive ou une crise thérapeutique, comme il s'en produit parfois avec le thermalisme (une réaction à l'hydrothérapie qui se caractérise par une aggravation initiale brève des symptômes).

Il est généralement admis que cette réaction est inoffensive et, par conséquent, elle n'est pas traitée. Toutefois, dans l'éventualité où de nouveaux symptômes apparaissent après l'utilisation de préparations homéopathiques, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster les médicaments. Dans certains cas, une pathogénésie homéopathique peut être observée et identifiée. Si cela se produit, l'agent homéopathique correspondant ainsi identifié peut être utilisé sous la forme Injeel. De plus, une préparation complexe comptant l'agent en question parmi ses ingrédients peut aussi être appropriée.

Une augmentation de l'activité des processus d'élimination est également un phénomène fréquemment observé au cours d'une thérapie homéopathique. Il peut s'agir de la libération accrue de la matière sécrétoire, de quantités accrues d'urine, etc. Généralement, de telles manifestations doivent être considérées comme les signes d'un pronostic favorable, en ce sens qu'elles indiquent le succès de l'élimination des substances pathogéniques (homotoxines). Même s'il s'agit de processus d'élimination qui, normalement, seraient considérés comme des symptômes pathologiques (par exemple, leucorrhées, ruptures de fistules, etc.), il n'en reste pas moins qu'ils indiquent que les pouvoirs d'auto-guérison de l'organisme ont été activés et sont à l'origine de ces processus d'élimination (ou phases de compensation), mis en œuvre pour débarrasser l'organisme des substances toxiques à l'origine des troubles. Ces phases de compensation constituent des « soupapes de libération biologique » et sont pratiquement identiques aux « sorties métaboliques », « sorties d'urgence métaboliques » et « canaux métaboliques auxiliaires » décrits par le Prof. Dr J. Kühnau, directeur de l'Institut de chimie physiologique de l'Université de Hambourg, en Allemagne; voir « Deutsches Ärzteblatt » No. 15/1969, pp. 1018–1021 : « Das Prinzip der metabolischen Konkurrenz » (le principe de la concurrence métabolique).

Toute action possible visant à entraver ces processus par l'entremise de mesures suppressives doit, par conséquent, être évaluée avec soin afin de déterminer si une telle action est absolument indispensable. Cela s'applique également aux cas de réaction fébrile, qui peuvent aussi survenir au cours d'une thérapie homéopathique.

Pourvu qu'un trouble donné n'ait pas endommagé de façon irréparable les organes d'un patient (jusqu'à maintenant), il est souvent possible de parvenir à rétablir intégralement l'état de santé à l'aide d'une thérapie appropriée, suivie pendant une période de temps suffisante. L'une des façons de déterminer la capacité de rétablissement d'un patient consiste à observer les réactions qui demeurent observables pendant l'administration des préparations indiquées. Des réactions initiales distinctives lors de la prise de la préparation thérapeutiquement indiquée sont souvent le signe que la symptomatologie courante requiert une thérapie relativement longue et intensive. Réciproquement, aux phases où le rétablissement est passablement avancé, aucune réaction n'est observable (ou encore, il s'agit tout au plus de réactions rudimentaires), même avec la prise de préparations Injeel dans leurs formes -Forte.

Si les organes ou les tissus ont subi des dommages ou des changements dégénératifs irréversibles, il est impossible de parvenir à une guérison permanente même avec la thérapie de stimulation homéopathique. Quoi qu'il en soit, l'administration de préparations correspondant à la symptomatologie du patient peut s'avérer bénéfique dans de tels cas. Comme ces préparations activent le système de détoxication de l'organisme, celui-ci sera mieux armé pour combattre les substances toxiques (homotoxines) générées par la maladie. Comme il a été mentionné ci-dessus, l'activité accrue des processus d'élimination est un signe de l'élimination des homotoxines. Dans la majorité des cas, une amélioration de l'état général du patient apparaît en même temps que cette amélioration des processus d'élimination ; les deux événements indiquent que le patient répond favorablement aux préparations choisies. Il est alors recommandé de poursuivre à long terme l'administration des préparations qui ont suscité une telle réponse favorable. Même si la pathologie principale ne peut être guérie par cette thérapie, il demeure possible dans plusieurs cas de libérer considérablement l'organisme de toxines pathologiques nuisibles supplémentaires et, par conséquent, d'améliorer la qualité de vie du patient tout en ralentissant le cours de la maladie.

1.6 Durée de conservation et entreposage des préparations Heel

Les produits qui portent une date d'expiration ne doivent pas être consommés après la date indiquée.

Les préparations en gouttes entreposées pendant de longues périodes de temps doivent être agitées plusieurs fois avant d'être utilisées. Toutes les préparations sous toutes les formes disponibles doivent être entreposées à l'abri des températures excessives et de la lumière directe du soleil. Les comprimés requièrent une protection supplémentaire contre l'humidité et la moiteur. Les préparations en suppositoires ne doivent en aucun cas être entreposées à une température supérieure à 25 °C pour éviter que les suppositoires ne ramollissent ou ne fondent. Même de façon temporaire, l'exposition à une température supérieure à 25 °C doit être évitée.

Lorsque vous avez besoin d'un coup de main

Soulagez la douleur associée à l'arthrite

Zeel[MD] cible l'inflammation chronique des articulations. L'utilisation à long terme permet de réduire de façon significative l'intensité et la fréquence de la douleur. Il a été démontré cliniquement que son efficacité est aussi grande que celle des médicaments conventionnels, sans engendrer les effets secondaires associés à ceux-ci.

Quelques produits complémentaires pour l'arthrite :

- Traumeel[MD] S
- Bryaconeel[MD]
- Lithiumeel[MD]
- Neralgo-Rhem-Injeel[MD]
- Detox-Kit[MD]

www.heel.ca

Heel

Référence : indication

Suggestions thérapeutiques

Abcès	Echinacea compositum
Acné vulgaire	Schwef-Heel Traumeel Echinacea compositum Hormeel Galium-Heel Cruroheel Detox-Kit
Adénome prostatique 1er stade	Sabal-Homaccord
Achalasie (constriction de l'œsophage)	Veratrum-Homaccord Duodenoheel Lyphosot
Accident vasculaire cérébral, traitement pré et post	Cralonin Melilotus-Homaccord Aesculus Compositum Arnica-Heel Cerebrum compositum
Acide lactique, accumulation de	Traumeel Acidum L(+) lacticum-Injeel forte
Acouphènes, otosclérose	Osteoheel Vertigoheel
Addison's (épuisement des surrénales)	Glandula suprarenalis suis-Injeel China-Homaccord Berberis-Homaccord Galium-Heel Hormeel
Agitation	Valerianaheel
Agitation chez l'enfant	Viburcol
Agranulocytose, traitement auxiliaire	Galium-Heel
Alcool,	
:: Suite à une consommation excessive	Nux vomica-Homaccord
:: Effets secondaires	Gastricumeel Hepeel Cralonin
:: Sevrage	Neuro-Heel

Allergies *voir aussi rhume des foins*	Luffeel Schwef-Heel Galium-Heel Engystol Lyphosot Hepar comp.-Heel Detox-Kit
Alopécie	Selenium-Homaccord Galium-Heel Aesculus compositum Traumeel format oral Traumeel pommade Detox-Kit
Amputation, moignons douloureux (douleur fantôme)	Traumeel Aesculus compositum
Amygdales, hypertrophie des –	Lyphosot
Amygdalite	Lyphosot Angin-Heel Mercurius-Heel Belladonna-Homaccord Echinacea comp.-Heel Traumeel Arnica-Heel Lyphosot
Angine de poitrine *voir angineux – troubles*	
Angineux, troubles – de poitrine	Cralonin Cardi-Heel
Angine amygdalienne *voir aussi sous amygdalite*	Lyphosot Angin-Heel Mercurius-Heel S Arnica-Heel Belladonna-Homaccord Traumeel
Annexite	Metro-Adnex-Injeel Gynäcoheel Echinacea compositum Traumeel

Anus, eczéma de l'–	Mucosa comp.-Heel Paeonia comp.-Heel Hepeel Cruroheel Traumeel
Anxiété	Nervoheel Neuro-Heel Valerianaheel Ignatia-Homaccord
Aphonie	Ignatia-Homaccord Phosphor-Homaccord
Apnée	Galium-Heel Barijodeel Lyphosot
Artères, inflammation des	Aesculus compositum
Artériosclérose	Vertigoheel Selenium-Homaccord Barijodeel Aesculus compositum Cralonin Galium-Heel Detox-Kit
Arthrite, arthrose	Zeel comp. Traumeel Rhododendroneel Kalmia compositum Neralgo-Rhem-Injeel Galium-Heel Ubicoenzyme Ranunculus-Homaccord Detox-Kit
Arthropathies	Traumeel Zeel comp. Kalmia compositum
Articulations, trouble des *voir arthropathies*	
Arythmie cardiaque	Cralonin Chelidonium-Homaccord
Ascite	Lyphosot Apis-Homaccord Galium-Heel

Asthme bronchique	Tartephedreel Drosera-Homaccord Husteel Mucosa comp.-Heel
Atonie intestinale	Nux vomica-Homaccord Mucosa comp.-Heel
Attaque d'apoplexie, états pré- et post-apoplectiques *voir accident vasculaire cérébral*	
Blépharite	Graphites-Homaccord Sulfur-Heel Oculoheel
Blessures, traitement des -	Traumeel
Bouche, inflammation ou ulcération *voir stomatite*	
Bouffées de chaleur (dues à la ménopause)	Klimakt-Heel
Boule hystérique	Ypsiloheel Ignatia-Homaccord
Bronchite	Tartephedreel Bronchalis-Heel Droperteel Mucosa comp.-Heel Gripp-Heel Engystol
Bronchite, asthmatiforme	Drosera-Homaccord Tartephedreel
Bronchite, spastique	Husteel
Bruxisme	Gelsemium-Homaccord
Brûlures	Causticum compositum
Bursite / Capsulite	Traumeel Arnica-Heel Bryaconeel Apis-Homaccord

Candida	Gynäcoheel Hormeel Traumeel
Catarrhe *voir sous les diverses indications*	
Catarrhe des conduits auditifs *voir hydropisie de l'oreille moyenne*	
Catarrhe nasal	Euphorbium compositum Euphorbium comp. – Vaporisateur nasal Naso-Heel Gripp-Heel
Céphalgie *voir aussi migraine*	Spigelon Gelsemium-Homaccord
Chéloïdes	Graphites-Homaccord Galium-Heel
Cheveux, problèmes de *voir alopécie, ecthyma*	
Cholangite, cholécystite cholélithiase	Chelidonium-Homaccord Hepar comp.-Heel Injeel-Chol
Cholestérol	Nux vomica-Homaccord Aesculus compositum Hepeel Hepar comp.-Heel
Circulation cérébrale, troubles de la	Circulo-Injeel Vertigoheel Detox-Kit
Circulation périphérique, post-emboliques, troubles de la	Aesculus compositum
Cicatrices	Graphites-Homaccord Galium-Heel Lyphosot
Claudication, intermittente	Aesculus compositum Circulo-Injeel

Cœur, désordres du	Cralonin
Collapsus	Veratrum-Homaccord Tonico-Injeel
Colique hépatique	Chelidonium-Homaccord Spascupreel
Colique	Spascupreel Chelidonium-Homaccord (biliaire) Viburcol
Colite muco-membraneuse et ulcéreuse	Nux vomica-Homaccord Veratrum-Homaccord Podophyllum compositum Mercurius-Heel Galium-Heel Detox-Kit
Commotion cérébrale	Traumeel Cerebrum compositum
Conjonctivite	Oculoheel Traumeel Mercurius-Heel
Constipation	Nux vomica-Homaccord
:: Chronique	Nux vomica-Homaccord Graphites-Homaccord
Convalescence tardive	Echinacea comp.-Heel Galium-Heel
Coqueluche	Drosera-Homaccord Droperteel Tartephedreel Husteel
Coup de soleil	Causticum compositum Traumeel
Croûtes de lait	Graphites-Homaccord
Cystalgie	Sabal-Homaccord Plantago-Homaccord
Cystite	Reneel Cantharis compositum Echinacea comp.-Heel

Cystite interstitielle	Berberis-Homaccord Cantharis compositum Echinacea comp.-Heel
Cystopyélite	Reneel Cantharis compositum Berberis-Homaccord
Dacryocystite	Oculoheel Mercurius-Heel
Débilité	Aletris-Heel China-Homaccord Tonico-Injeel
Dépôts de calcium dans les articulations (arthropathies micro-cristallines)	Traumeel Osteoheel Lyphosot
Dépression, endogène	Nervoheel Neuro-Heel Natrium pyruvicum-Injeel
Dépression, exogène	Ignatia-Homaccord Nervoheel Neuro-Heel Cerebrum compositum Hepar comp.-Heel
Dermatite, dermatose	Belladonna-Homaccord Hepar comp.-Heel Graphites-Homaccord Schwef-Heel Sulfur-Heel Traumeel Echinacea comp.-Heel Kalmia compositum Lyphosot Apis-Homaccord Hepeel Galium-Heel Detox-Kit
Dermatomycose, traitement auxiliaire	Sulfur-Heel Graphites-Homaccord Detox-Kit

Détoxification	Detox-Kit : - Nux vomica-Homaccord - Berberis-Homaccord - Lyphosot Galium-Heel Hepar comp.-Heel Hepar suis-Injeel Ubicoenzyme Pulsatilla compositum Funiculus umbilicalis suis-Injeel
Détoxification avancée	Hepar comp.-Heel Berberis-Homaccord Ubicoenzyme Galium-Heel Funiculus umbilicalis suis-Injeel Pulsatilla compositum
Développement, troubles du – chez l'enfant	Tonico-Injeel Lyphosot Cerebrum compositum
Diabète sucré, thérapie auxiliaire	Leptandra compositum Momordica compositum Traumeel Cruroheel
Diarrhée	Diarrheel Veratrum-Homaccord Mucosa comp.-Heel
Diathèse, arthritique/rhumatismale *voir aussi arthrite/arthrose et rhumatisme*	Lithiumeel
Diathèse, exsudative	Lyphosot Calcoheel
Disques intervertébraux, blessures, discopathies *voir ostéochondrose*	
Diverticulite traitement auxiliaire	Veratrum-Homaccord Nux vomica-Homaccord Diarrheel Mucosa comp.-Heel
Doigts (engourdissement, fourmillement)	Circulo-Injeel

Douleurs générales	Spigelon Gelsemium-Homaccord Traumeel
Douleurs de croissance	Phosphor-Homaccord Calcoheel
Douleurs, lombaires *voir lumbago*	
Dumping, **syndrome de**	Duodenoheel
Duodénum, **inflammation du** **(duodénite)**	Nux vomica-Homaccord Mucosa comp.-Heel Diarrheel
Duodénum, **syndrome du**	Duodenoheel
Dysménorrhée **intermenstruelle**	Aesculus compositum Metro-Adnex-Injeel Gynäcoheel Hormeel
Dyspepsie *voir pyrosis*	
Dystonie, **neurovégétative**	Ypsiloheel China-Homaccord Galium-Heel Ignatia-Homaccord
Ecchymoses	Traumeel
Eczéma	Engystol Detox-Kit Sulfur-Heel Paeonia comp.-Heel
:: Eczéma irritant	Schwef-Heel
:: Eczéma pustuleux	Apis-Homaccord
:: Eczéma chronique et sec	Graphites-Homaccord
:: Eczéma variqueux	Aesculus-Heel Hamamelis-Homaccord
:: Eczéma vésiculaire	Mezereum-Homaccord
Éléphantiasis	Aesculus compositum Lyphosot Galium-Heel

Embolie, à la suite de	Aesculus compositum
Empyème	Cruroheel Traumeel Arnica-Heel Echinacea comp.-Heel
Encéphalite, à la suite de	Apis-Homaccord Echinacea comp.-Heel Cerebrum compositum Belladonna-Homaccord Gelsemium-Homaccord Aesculus compositum
Endométrite	Gynäcoheel Metro-Adnex-Injeel Arnica-Heel
Engelures	Aesculus compositum
Enrouement	Phosphor-Homaccord Vinceel
Entérocolite	Echinacea comp.-Heel Nux vomica-Homaccord Veratrum-Homaccord Mucosa comp.-Heel
Entorse	Traumeel
Enurésie nocturne	Plantago-Homaccord Reneel Hormeel Lyphosot Nervoheel
Enzymes (déficience des fonctions enzymatiques)	Ubicoenzyme Glyoxal compositum
Épicondylite	Traumeel Ferrum-Homaccord Bryaconeel
Épigastre, syndrome de l'– *(voir syndrome épigastrique)*	

Épuisement / fatigue	Aletris-Heel Tonico-Injeel Causticum compositum China-Homaccord Cocculus-Homaccord Selenium-Homaccord Cralonin
Éructation	Vomitusheel Nux vomica-Homaccord Veratrum-Homaccord
Éruption cutanée (causée par des infections systémiques) *voir exanthème*	
Erythème solaire (coup de soleil)	Traumeel
Escarre (plaie de lit)	Traumeel Aesculus compositum
Exanthème	Apis-Homaccord Traumeel Hepar comp.-Heel Sulfur-Heel Detox-Kit
Exostoses	Osteoheel
Faiblesse *voir débilité*	
Fasciite plantaire	Traumeel Zeel comp.
Fièvre des foins *voir rhume des foins*	
Fissures *voir aussi fissures anales*	Traumeel Paeonia comp.-Heel
Fissures anales	Traumeel Hamamelis-Homaccord Paeonia comp.-Heel
Fistules	Traumeel Cruroheel Echinacea comp.-Heel Mercurius-Heel

Flatulence *voir aussi météorisme*	Gastricumeel Nux vomica-Homaccord Diarrheel Hepeel Mucosa comp.-Heel
:: Flore intestinale anormale	Mucosa comp.-Heel Veratrum-Homaccord
Foie, maladies du	Hepeel Hepar comp.-Heel Chelidonium-Homaccord Injeel-Chol Hepar suis-Injeel Leptandra compositum Galium-Heel
Fractures, traitement auxiliaire	Traumeel Osteoheel Zeel comp. Cimicifuga-Homaccord
Furoncle, anthrax	Arnica-Heel Belladonna-Homaccord Mercurius-Heel Traumeel Echinacea comp.-Heel
Furonculose	Belladonna-Homaccord Mercurius-Heel Traumeel Arnica-Heel Echinacea comp.-Heel
Gangrène de la jambe, causé par un excès de cigarette	Aesculus compositum
Gastrite	Gastricumeel Mucosa comp.-Heel
Gastro-cardiaque, complexe symptomatique, traitement auxiliaire	Ceanothus-Homaccord Spascupreel Duodenoheel Leptandra compositum Gastricumeel Mucosa comp.-Heel Cardi-Heel

Gastro-entérite	Veratrum-Homaccord Diarrheel Echinacea comp.-Heel Duodenoheel Gastricumeel Mucosa comp.-Heel Vomitusheel
Gingivite / gencives, infection ou inflammation	Traumeel Echinacea comp.-Heel
Glandes lacrymales, inflammation *voir dacryocystite*	
Glandulaires, désordres	Glyoxal compositum Lyphosot Strumeel / Strumeel forte
Glomérulonéphrite	Cantharis compositum Echinacea comp.-Heel
Goitre, prophylaxie	Strumeel / Strumeel forte
Goutte	Lithiumeel Natrium pyruvicum-Injeel forte
Granulocytopénie, traitement auxiliaire	Galium-Heel Mercurius-Heel
Grippe, affections grippales	Gripp-Heel Bryaconeel Engystol Echinacea comp.-Heel Euphorbium compositum Euphorbium comp. – Vaporisateur nasal Viburcol
Hématomes	Traumeel
Hémorragie, capillaire	Hamamelis-Homaccord
Hémorragie, pétéchiale	Phosphor-Homaccord
Hémorroïdes	Aesculus-Heel Paeonia comp.-Heel Podophyllum compositum Veratrum-Homaccord Traumeel

Hépatiques, troubles – *voir foie*	
Hépatite	Chelidonium-Homaccord Hepar comp.-Heel Hepeel Injeel-Chol Nux vomica-Homaccord Duodenoheel Gastricumeel Galium-Heel Engystol Traumeel
Hernie hiatale	Gastricumeel Mucosa comp.-Heel
Hormones, débalancement chez la femme	Hormeel
Hydropisie de l'oreille moyenne	Traumeel - Gouttes otiques Euphorbium compositum
Hyperacidité	Gastricumeel Duodenoheel Mucosa comp.-Heel Nux vomica-Homaccord
Hypercholestérolémie *voir cholestérolémie*	
Hyperexcitation *voir aussi agitation*	Valerianaheel Nervoheel Viburcol
Hyperhidrose	Hormeel Hepeel Nervoheel Berberis-Homaccord Schwef-Heel Phosphor-Homaccord Traumeel
Hypertension	Melilotus-Homaccord Hepeel Cralonin Reneel Belladonna-Homaccord

Hypotonie	Rheuma-Heel Tonico-Injeel China-Homaccord Ubicoenzyme
Immunité, stimulation du système immunitaire	Echinacea comp.-Heel Engystol Galium-Heel Schwef-Heel Ubicoenzyme Pulsatilla compositum
Impétigo contagieux	Mercurius-Heel Traumeel
Incontinence urinaire	Plantago-Homaccord
Infarctus, suite à -	Cralonin
Infection fongique de la peau *voir dermatomycose et mycose*	
Inflammation	Traumeel Arnica-Heel Echinacea comp.-Heel
Inflammation (mains et pieds) *voir engelures*	
Inflammation, locale	Belladonna-Homaccord
Inoculation, réactions	Traumeel Engystol Mercurius-Heel Belladonna-Homaccord
Insomnie	Neurexan Valerianaheel Nervoheel
Insuffisance cardiaque :: Chez les patients ne démontrant pas encore de glucosides cardiaques	Cralonin Cardi-Heel
Intertrigo	Graphites-Homaccord Schwef-Heel Traumeel

Intestins (inflammation) *voir aussi colite, entérocolite*	Echinacea comp.-Heel Veratrum-Homaccord Mucosa comp.-Heel
Intestins, spasmes	Spascupreel
Jaunice (obstructive) *voir ictère choléstatique*	Chelidonium-Homaccord
Laryngite	Phosphor-Homaccord Tartephedreel Mucosa comp.-Heel
Leucorrhée	Gynäcoheel Hormeel Echinacea comp.-Heel Traumeel Metro-Adnex-Injeel
Lumbago	Colocynthis-Homaccord Ranunculus-Homaccord Cimicifuga-Homaccord Spascupreel
Luxations	Traumeel
Lymphatisme *voir aussi diathèse exsudative*	Lyphosot Barijodeel Calcoheel
Mal des transports *voir aussi cinétoses*	Cocculus-Homaccord Vertigoheel
Maladies coronariennes	Cralonin
Maladies de la peau *voir aussi sous les diverses affections de la peau*	Graphites-Homaccord Sulfur-Heel Schwef-Heel Echinacea comp.-Heel Engystol Traumeel Detox-Kit Funiculus umbilicalis suis-Injeel
Maladie de Menière	Vertigoheel Osteoheel Barijodeel Cruroheel Galium-Heel

Maladies dégénératives	Glyoxal compositum Viscum album-Injeel forte Viscum compositum medium / forte Traumeel Ubicoenzyme
Maladies infectieuses, stimulation du système immunitaire particulièrement en cas de maladies virales	Engystol
Mastite	Echinacea comp.-Heel Traumeel
Maux de tête *voir migraine*	
Mémoire, défaillance de la	Selenium-Homaccord Cerebrum compositum Vertigoheel
Ménopause	Klimakt-Heel Hormeel Nervoheel Metro-Adnex-Injeel Neurexan Tonico-Injeel
Ménorrhagie, métrorrhagie	Phosphor-Homaccord Gynäcoheel Metro-Adnex-Injeel Vaccininum-Injeel
Menstruations, (douleur entre les cycles)	Metro-Adnex-Injeel
Météorisme	Gastricumeel Nux vomica-Homaccord Leptandra compositum
Métrite	Gynäcoheel Metro-Adnex-Injeel Arnica-Heel Traumeel Echinacea comp.-Heel
Microsporie *voir aussi dermatomycose*	Graphites-Homaccord Traumeel Hepar suis-Injeel

Migraine	Spigelon Gelsemium-Homaccord
Mononucléose	Lyphosot Echinacea compositum Mercurius-Heel Engystol
Muqueuses, (affections des)	Mucosa comp.-Heel
Muscles, durcissement *voir myogélose*	
Myocarde, maladies du	Cralonin
Mycose interdigitale, traitement auxiliaire *voir aussi dermatomycose*	Graphites-Homaccord Sulfur-Heel Traumeel Hormeel Cruroheel Mercurius-Heel
Myogélose *voir aussi rhumatisme musculaire*	Spascupreel Neralgo-Rhem-Injeel
Naevi	Graphites-Homaccord Galium-Heel Lyphosot
Nausées	Vomitusheel
Néoplasmes traitement biologique auxiliaire	Viscum compositum medium/forte Colchicum compositum Podophyllum compositum Pulsatilla compositum Causticum compositum
Néphrolithiase	Reneel Berberis-Homaccord Spascupreel
Néphrosclérose	Barijodeel Aesculus compositum Apis-Homaccord

Néphrose	Reneel Lyphosot Berberis-Homaccord Traumeel Apis-Homaccord Barijodeel
Névralgie	Gelsemium-Homaccord Colocynthis-Homaccord Ranunculus-Homaccord Bryaconeel Spigelon Neralgo-Rhem-Injeel Rhododendroneel Cimicifuga-Homaccord
Névralgie intercostale	Ranunculus-Homaccord Colocynthis-Homaccord Neralgo-Rhem-Injeel
Neurasthénie	Valerianaheel
Névrodermite	Hepar comp.-Heel Graphites-Homaccord Traumeel Hepeel Chelidonium-Homaccord Schwef-Heel
Névrose climatérique	Klimakt-Heel Nervoheel Metro-Adnex-Injeel
Œdème	Apis-Homaccord Lyphosot
Œdème, post-opératoire et post-traumatique	Traumeel Lyphosot
Œil, inflammation *voir dacryocystite, conjonctivite*	
Oreilles *voir otite externe, otite moyenne, hydropisie*	
Oreilles, Catarrhe tubaire	Traumeel - Gouttes otiques Euphorbium compositum Mucosa comp.-Heel

Os (dégénérescence)
voir ostéochondrose

Os (exostoses)
voir exostoses

Os (inflammation)
voir ostéomyélite

Ostéochondrose	China-Homaccord Colocynthis-Homaccord
:: En particulier la région lombaire de la colonne vertébrale	Gelsemium-Homaccord Cimicifuga-Homaccord
:: En particulier la région cervicale de la colonne vertébrale	Neralgo-Rhem-Injeel
Ostéomyélite	Echinacea comp.-Heel Traumeel
Otite externe	Echinacea comp.-Heel Traumeel – Gouttes otiques Traumeel – Pommade
Otite moyenne	Echinacea comp.-Heel Arnica-Heel Belladonna-Homaccord Traumeel – Gouttes otiques Traumeel – Pommade Viburcol
Ovarienne, dysfunction	Gynäcoheel Hormeel Graphites-Homaccord
Pancréas, désordres du -	Leptandra compositum Mormordica compositum
Parodontose, parodontite	Traumeel
Paramétrite	Gynäcoheel Metro-Adnex-Injeel

Paupières (inflammation)
voir blépharite

Peau, hyperhidrose *voir hyperhidrose*	
Peau, suppuration *voir pyodermie*	
Périarthrite	Rhododendroneel Traumeel Zeel comp. Galium-Heel
Périarthrite, scapulo-humérale	Zeel comp. Traumeel Ferrum-Homaccord Neralgo-Rhem-Injeel Bryaconeel
Périostite	Osteoheel Belladonna-Homaccord Kalmia compositum Bryaconeel
Pertussis *voir coqueluche*	
Pharyngite	Phosphor-Homaccord Vinceel Tartephedreel Euphorbium compositum Echinacea comp.-Heel Mucosa comp.-Heel Bronchalis-Heel Belladonna-Homaccord
Phlébite, thrombophlébite	Hamamelis-Homaccord Aesculus compositum Belladonna-Homaccord Arnica-Heel Traumeel
Phlegmon	Echinacea comp.-Heel Traumeel Belladonna-Homaccord
Plaies, traitement des (décubitus)	Traumeel Cruroheel Lyphosot Arnica-Heel Mercurius-Heel Echinacea comp.-Heel

Pléthore	Melilotus-Homaccord Nux vomica-Homaccord
Pleurésie	Ranunculus-Homaccord Husteel Bryaconeel
Polyarthrite, chronique, évolutive	Rhododendroneel Zeel comp. Bryaconeel Galium-Heel
Post-opératoire, traitement	Traumeel Lyphosot
Prophylaxie, stimulation du système immunitaire	Engystol Galium-Heel Schwef-Heel Pulsatilla compositum
Prostatite	Sabal-Homaccord Mucosa comp.-Heel Belladonna-Homaccord
Prurit	Sulfur-Heel Mezereum-Homaccord Mercurius-Heel Schwef-Heel Hepeel Lyphosot
Psychoses, maladies psychosomatiques	Neuro-Heel Nervoheel Gelsemium-Homaccord Ignatia-Homaccord Ypsiloheel
Pyélite, néphropyélite	Cantharis compositum Reneel Berberis-Homaccord Echinacea comp.-Heel Belladonna-Homaccord
Pyodermie	Traumeel Schwef-Heel
Pyrosis	Gastricumeel Mucosa comp.-Heel Nux vomica-Homaccord

Reflux gastrique	Gastricumeel Hepar comp.-Heel
Reins, inflammation *voir pyélite, pyélocystite*	
Reins, sclérose *voir néphrosclérose*	
Reins, pierres (calculs) *voir néphrolithiase*	
Reins et vessie, affections des reins et de la vessie	Cantharis compositum Reneel
Rhumatismes, de formes diverses	Zeel comp.
:: Affections des articulations, tendons et tissus conjonctifs	Kalmia compositum
:: Arthrose, polyarthrose	Traumeel
:: Syndrome cervical	Osteoheel Gelsemium-Homaccord
:: Névralgie intercostale	Rhododendroneel
:: Névralgie	China-Homaccord
:: Ostéochondrose	Bryaconeel Cimicifuga-Homaccord
:: Ostéochondrose, particulièrement dans la région cervicale de la colonne vertébrale	Colocynthis-Homaccord
:: Périostite	Lithiumeel
:: Diathèse uratique-rhumatismale	Neralgo-Rhem-Injeel
:: Rhumatismes des tissus mous	Ranunculus-Homaccord
:: Rhumatismes des tissus mous et météotropes	Spascupreel
:: Syndrome scapulo-huméral	Gelsemium-Homaccord
:: Aggravation par temps humide	Ferrum-Homaccord
Rhumatismes des tissus mous	Neralgo-Rhem-Injeel

Rhumatismes musculaires	Rhododendroneel Traumeel
Rhinite (atrophique) traitement auxiliaire	Euphorbium compositum Euphorbium comp. - Vaporisateur nasal
Rhinites d'origines diverses, virale, bactérienne, allergique	Euphorbium comp. - Vaporisateur nasal Luffeel Luffeel - Vaporisateur nasal Naso-Heel Echinacea comp.-Heel Engystol Gripp-Heel Traumeel
Rhume des foins	Luffeel Luffeel - Vaporisateur nasal Euphorbium compositum Euphorbium comp. - Vaporisateur nasal Mucosa comp.-Heel
Rythme cardiaque, troubles du – *voir arythmie cardiaque*	
Rosacée *voir télangiectasies*	
Salpingite	Gynäcoheel
Salpingo-ovarite *voir annexite*	
Sciatique	Colocynthis-Homaccord Rhododendroneel Spascupreel Traumeel
Sclérodermie	Aesculus compositum Galium-Heel Hormeel Graphites-Homaccord Lyphosot
Sclérose cérébrale	Selenium-Homaccord Barijodeel

Sclérose latérale amyotrophique / Maladie de Lou Gehrig	Ubicoenzyme Spascupreel Cerebrum compositum Selenium-Homaccord Vertigoheel Aesculus compositum Circulo-Injeel Reneel Detox-Kit
Scrofuleux, états	Calcoheel Lyphosot Mercurius-Heel
Sevrage, d'alcool ou de tabac	Neuro-Heel
Sinusite	Euphorbium compositum Euphorbium comp. - Vaporisateur nasal Naso-Heel Echinacea comp.-Heel Mucosa comp.-Heel Graphites-Homaccord Traumeel
Spasmes	Spascupreel
Spasmes intestinaux	Spascupreel
Spondylarthrose	Zeel comp. Traumeel
Stimulation du système lymphatique	Lyphosot
Stomatite	Echinacea comp.-Heel Mucosa comp.-Heel Traumeel
Stress	Nervoheel Neurexan Valerianaheel
Struma parenchymateux (diffus)	Strumeel forte
Struma parenchymateux (juvénile)	Strumeel

Styloïdite *voir aussi épicondylite*	Traumeel Ferrum-Homaccord
Suppurations (fistules)	Traumeel Echinacea comp.-Heel Cruroheel
Suppurations des poches de gencives	Traumeel
Surdité labyrinthique	Aesculus compositum Osteoheel
Syndrome cervical	Gelsemium-Homaccord Cimicifuga-Homaccord
Syndrome de chasse *voir dumping*	
Syndrome duodénal *voir duodénum*	
Syndrome épigastrique	Ceanothus-Homaccord Leptandra compositum Momordica compositum
Syndrome prémenstruel	Ignatia-Homaccord Hormeel Nervoheel Neurexan
Syndrome scapulo-huméral *voir sous périarthrite scapulo-humérale*	
Système immunitaire, stimulation du	Echinacea comp.-Heel Engystol Galium-Heel Schwef-Heel Ubicoenzyme Pulsatilla compositum
Système lymphatique, stimulation du –	Lyphosot
Télangiectasie traitement auxiliaire	Hamamelis-Homaccord Aesculus compositum
Températures humides, aggravation des symptômes	Rhododendroneel

« Tennis elbow »
voir épicondylite

Ténosynovite
Traumeel
Arnica-Heel

Thrombophlébite
Hamamelis-Homaccord
Aesculus compositum
Belladonna-Homaccord
Arnica-Heel
Traumeel

Thyroïde, dysfonction de la -
Strumeel

Toux
voir aussi sous les indications précises telles que bronchite etc.
Husteel
Tartephedreel
Drosera-Homaccord
Brocosin
Bronchalis-Heel
Droperteel

Toxicoses focales
Echinacea comp.-Heel
Arnica-Heel
Traumeel
Galium-Heel
Hepeel

Trachéite
Tartephedreel
Belladonna-Homaccord
Mucosa comp.-Heel
Echinacea comp.-Heel

Transpiration, excessive
voir hyperhidrose

Transports, mal des
voir cinétoses
Cocculus-Injeel forte
Vertigoheel

Troubles du rythme cardiaque
voir aussi arythmie

Tumeurs
voir aussi sous néoplasmes

Ulcère de la jambe	Cruroheel Aesculus compositum Hamamelis-Homaccord Hepeel Lyphosot
Ulcère de l'estomac et du duodénum	Gastricumeel Duodenoheel Mucosa comp.-Heel
Urétrite	Mucosa comp.-Heel Traumeel
Urinaires, passages, conditions inflammatoires -	Reneel Sabal-Homaccord Berberis-Homaccord
Urinaires, troubles des voies	Sabal-Homaccord
Urticaire	Belladonna-Homaccord Sulfur-Heel Apis-Homaccord Hepeel Sulfur-Heel Schwef-Heel
Utérus, inflammation de l' *voir aussi métrite*	Gynäcoheel Metro-Adnex-Injeel Arnica-Heel Traumeel Echinacea comp.-Heel
Vaginite	Gynäcoheel Metro-Adnex-Injeel Echinacea comp.-Heel Traumeel
Varices	Aesculus-Heel Hamamelis-Homaccord Traumeel Lyphosot
Veine porte, congestion de	Leptandra compositum Injeel-Chol Chelidonium-Homaccord
Veine, stases	Aesculus-Heel Hamamelis-Homaccord Aesculus compositum

Vertiges, d'origines diverses	Vertigoheel Cocculus-Homaccord
Vésicule biliaire (inflammation) *voir cholangite*	
Vésicule biliaire *voir cholangite*	
Voix, perte de la *voir aphonie*	
Zona	Ranunculus-Homaccord Traumeel Engystol Mezereum-Homaccord

Ciblez les toxines de l'intérieur

Profonde, douce et durable : détoxification

Detox-Kit[MD] associe trois médicaments afin de stimuler le processus naturel de nettoyage de l'organisme et d'aider à le maintenir de façon à favoriser la santé à long terme de même qu'une meilleure qualité de vie. Les mécanismes d'excrétion sont stimulés pour appuyer en douceur et tout naturellement les processus d'élimination des toxines qui autrement, s'accumuleraient et engendreraient des maladies.

www.heel.ca

-Heel

Référence : **DESCRIPTION DES PRODUITS**

1 Préparations complexes antihomotoxiques

2 Préparations Injeel[MD] et Injeel[MD] forte – Médicaments unitaires homéopathiques en accords de dynamisation

1 Préparations complexes antihomotoxiques

Aesculus compositum

Disponible jusqu'à écoulement de l'inventaire

:: GOUTTES *DIN-HM 80012945*

Composition : 100 ml cont. : Aesculus hippocastanum D4 10 g; Hamamelis virginiana D4, Lycopodium clavatum D4, Melilotus officinalis D4, Secale cornutum D4, Sulfur D8, Vipera berus D10 1 g chaque.

Indications : stimulation des mécanismes de défenses endogènes lors de troubles circulatoires périphériques, tels que la gangrène de la jambe due à une consommation excessive de cigarettes, claudication intermittente, endartérite oblitérante, artériosclérose, ulcère de décubitus, éléphantiasis, dysménorrhée, troubles de la circulation post-emboliques, traitement adjuvant post-apoplectiques et post-infarctiques.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Aesculus compositum

Nouvelle formulation

:: GOUTTES *NPN à venir*

Composition : 100 ml contient :

Ingrédients médicinaux homéopathiques : Aesculus hippocastanum D3 10 g; Echinacea D2; Viscum album D2; Arnica montana D3; Eupatorium cannabinum D3; Secale cornutum D3; Acidum benzoicum e resina D4; Apis mellifica D4; Baptisia tinctoria D4; Colchicum autumnale D4; Dulcamara D4; Hamamelis virginiana D4; Rhus toxicodendron D4; Ruta graveolens D4; Barium iodatum D6; Solanum nigrum D6; Natrum pyruvicum D8; Tabacum D10; Cuprum metallicum D13 1 g chaque.

Ingrédients médicinaux organothérapiques : Sus scrofa domesticus (cochon domestique) : Arteria suis (artère) D10 1 g.

Indications : stimulation des mécanismes de défenses endogènes lors de troubles circulatoires périphériques, tels que la gangrène de la jambe due à une consommation excessive de cigarettes, claudication intermittente, endartérite oblitérante, artériosclérose, ulcère de décubitus, éléphantiasis, dysménorrhée, troubles de la circulation post-emboliques, traitement adjuvant post-apoplectiques et post-infarctiques.

Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse. Hypersensibilité à l'herbe à poux, à l'un des ingrédients actifs ou excipients, ou aux plantes de la famille des marguerites (Asteracées) telles que l'Arnica et l'Echinacea. En principe, l'échinacée ne devrait pas être utilisée en cas de maladies systémiques progressives telles que la tuberculose, la leucémie ou les maladies de type leucémiques, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif (p. ex. collagénoses), les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, le SIDA, l'infection au VIH et d'autres maladies virales chroniques. Les produits contenant du Viscum album ne devraient pas être utilisés dans les cas d'allergies au gui, dans les cas de maladies granulomateuses chroniques ou auto-immunes en présence d'un déséquilibre métabolique. En cas d'inflammation aiguë ou d'une fièvre élevée, interrompre le traitement jusqu'à ce que les symptômes inflammatoires disparaissent. Ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.
Effets secondaires : dans de très rares cas, des troubles gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent survenir, même plusieurs jours après utilisation. Dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire chez des personnes hypersensibles aux plantes de la famille des marguerites (Asteraceae). Rougeurs, démangeaisons (prurit) et dans de rares cas, de l'œdème facial, une détresse respiratoire (dyspnée), des étourdissements et une baisse de pression artérielle ont été notés après l'utilisation de produits contenant des extraits d'échinacée.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Consulter un praticien en soins de santé avant d'utiliser ce produit si vous allaitez. En raison d'un manque d'expérience documenté, ce produit ne devrait être utilisé que chez les adultes (12 ans et plus).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Aesculus-Heel[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80012885*
Composition : 100 ml cont. : Aesculus hippocastanum D2 100 g.
Indications : varices, stase veineuse, eczéma variqueux, hémorroïdes.
Mentions de risque : contient 70 vol.-% alcool. Pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Aletris-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 01969293*
Composition : 1 comprimé cont. : Aletris farinosa D4, Cocculus D4, Helonias dioica D4, Kalium carbonicum D4 45 mg chaque; Sepia D6 60 mg; Natrium chloratum D6 30 mg; Acidum picrinicum D6, Chininum arsenicosum D6 15 mg chaque.
Indications : états d'épuisement et de faiblesse.
Contre-indications : hypersensibilité à la quinine.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Angin-Heel[MD] SD

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80014422*
Composition : 1 comprimé cont. : Belladonna D4 60 mg; Apis mellifica D4, Arnica montana D4, Phytolacca D4 30 mg chaque; Hepar sulfuris calcareum D6 60 mg; Mercurius cyanatus D8 30 mg.
Indications : amygdalite.
Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire chez les personnes ayant une hypersensibilité aux composées (Arnica).
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : si vos symptômes persistent plus de 3 jours, s'aggravent ou si vous faites de la fièvre supérieure à 39°C, consultez un praticien en soins de santé.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Apis-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80011599*

Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Kalium stibyltartaricum D4, Kalium stibyltartaricum D10, Kalium stibyltartaricum D30, Kalium stibyltartaricum D200 4,4 mg chaque; Scilla D4, Scilla D10, Scilla D30 2,75 mg chaque; Apis mellifica D4, Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Apis mellifica D1000 1,1 mg chaque; Apisinum D8, Apisinum D30 2,75 mg chaque.

Indications : œdèmes, affections cutanées vésiculaires telles que l'eczéma pustuleux et bulleux, états d'irritation cérébrale.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, ⅓ ampoule (0,3 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅓ ampoule (0,3 ml) jusqu'à 3 fois par jour.

Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Apis-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80013229*

Composition : 100 ml cont. : Kalium stibyltartaricum D2, Kalium stibyltartaricum D10, Kalium stibyltartaricum D30, Kalium stibyltartaricum D200 0,4 g chaque; Scilla D2, Scilla D10, Scilla D30 0,25 g chaque; Apis mellifica D2, Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Apis mellifica D1000 0,1 g chaque; Apisinum D6, Apisinum D30 0,25 g chaque.

Indications : œdèmes, affections cutanéees vésiculaires telles que l'eczéma pustuleux et bulleux, états d'irritation cérébrale.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Nourrissons (0 à 12 mois), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Arnica-Heel[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80012889*

Composition : 100 ml cont. : Acidum benzoicum e resina D3, Arnica montana D3, Echinacea D3, Lycopersicum esculentum D3, Mercurialis perennis D3 5 g chaque; Apis mellifica D4, Baptisia tinctoria D4, Dulcamara D4, Eucalyptus globulus D4, Solanum nigrum D4 10 g chaque; Bryonia D4, Colchicum autumnale D4, Eupatorium cannabinum D4 5 g chaque; Rhus toxicodendron D6 10 g.

Indications : inflammation localisée et générale (sub) aiguë et (sub) chronique.

Contre-indications : hypersensibilité aux tomates, aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées (p. ex. Arnica)) ou à l'herbe à puce. Ne pas prendre si vous êtes enceinte.

Effets secondaires : dans de très rares cas, des inconforts gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent survenir, même plusieurs jours après l'utilisation. Des réactions d'hypersensibilité pourraient avoir lieu dans certains cas isolés, chez les personnes hypersensibles aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées (p. ex. Arnica, rudbeckie)).

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Barijodeel

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80014009*

Composition : 1 comprimé cont. : Arnica montana D4, Stramonium D4 30 mg chaque; Calcium iodatum D4 15 mg; Anacardium D6, Causticum Hahnemanni D6 45 mg chaque; Ignatia D6, Kalium phosphoricum D6 30 mg chaque; Aconitum napellus D12 45 mg; Barium carbonicum D12 30 mg.

Indications : artériosclérose, en particulier l'artériosclérose cérébrale; mauvais drainage lymphatique.

Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica.

Effets secondaires : des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire chez les personnes hypersensibles aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées) (Arnica). Dans les cas de maladies thyroïdiennes, ne pas utiliser sans un avis médical.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Belladonna-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80013171*

Composition : 100 ml cont. : Belladonna D2, Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna 1000, Echinacea D10, Echinacea D30, Echinacea D200 0,5 g chaque.

Indications : inflammation localisée, p.ex. amygdalite, furonculose, anthrax.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Nourrissons (0 à 12 mois), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Berberis-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80025229*

Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Berberis vulgaris D4, Berberis vulgaris D10, Berberis vulgaris D30, Berberis vulgaris D200 4,4 mg chaque; Colocynthis D4, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 3,3 mg chaque; Veratrum album D5, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200 3,3 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique pour supporter les reins et le système urinaire, pour soulager les symptômes tels que les sensations de douleur et de brûlures, ainsi que faciliter l'élimination d'urine.

Contre-indications : ne pas utiliser durant le premier trimestre de la grossesse.

Mentions de risque : consultez un praticien en soins de santé avant d'administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) 1-3 fois par semaine. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) par jour.

Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Berberis-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80024564*

Composition : 100 ml cont. : Berberis vulgaris D2, Berberis vulgaris D10, Berberis vulgaris D30, Berberis vulgaris D200 0,4 g chaque; Colocynthis D2, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 0,3 g chaque; Veratrum album D3, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200 0,3 g chaque.

Indications : préparation homéopathique pour supporter les reins et le système urinaire, pour soulager les symptômes tels que les sensations de douleur et de brûlures, ainsi que faciliter l'élimination d'urine.

Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse et l'allaitement.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). L'administration de cette préparation à long terme (pendant plusieurs mois) doit être suivie par un praticien en soins de santé.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Brocosin[MD]

:: SIROP *DIN-HM 02248456*

Composition : 100 ml cont. : Drosera rotundifolia D4, Ipecacuanha D4, Rumex crispus D4, Antimonium tartaricum D6, Cuprum sulphuricum D6, Spongia tosta D8 1,67 g chaque.

Indications : préparation homéopathique pour le soulagement temporaire des toux sèches et grasses occasionnées par le rhume et la grippe ou les irritants environnementaux.

Mentions de risque : consulter un praticien en soins de santé si la toux s'aggrave, persiste plus d'une semaine ou si elle est accompagnée d'une forte fièvre. Consulter un praticien en soins de santé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 à 2 cuillerées à thé (5 à 10 ml) toutes 4 à 6 heures. Enfants (2 à 12 ans), 1 cuillerée à thé (5 ml) 3 fois par jour.

Présentation : bouteille de 125 ml.

Bronchalis-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80015101*
Composition : 1 comprimé cont. : Bryonia D4, Hyoscyamus niger D4 60 mg chaque; Belladonna D4, Ipecacuanha D4, Kalium stibyltartaricum D4, Lobelia inflata D4, Sticta D4, Kreosotum D5 30 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour le soulagement des symptômes de la toux bronchique.
Effets secondaires : allergie au phénol.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Bryaconeel

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80020907*
Composition : 1 comprimé cont. : Aconitum napellus D4 150 mg, Bryonia D4 120 mg, Phosphorus D5 30 mg.
Indications : névralgies, aussi si associées aux maladies rhumatismales, infections de type grippales.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Calcoheel

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003133*
Composition : 1 comprimé cont. : Chamomilla D4, Dulcamara D6 30 mg chaque; Calcium carbonicum Hahnemanni D8 180 mg; Carbo vegetabilis D12 60 mg.
Indications : désordres du métabolisme du calcium, mauvais drainage lymphatique.
Contre-indications : hypersensibilité à la camomille ou à d'autres plantes de la famille des marguerites (Astéracées).

Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions allergiques cutanées peuvent se produire.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Cantharis compositum S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004494*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Cantharis D4, Arsenicum album D8, Hepar sulfuris calcareum D8, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 22 mg chaque.
Indications : stimulation des défenses de l'organisme en cas de cystites, pyélites et néphrites.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Interactions avec d'autres médicaments : la littérature homéopathique indique que l'absorption préalable ou subséquente de café régulier ou sous forme homéopathique peut réduire l'efficacité thérapeutique de Cantharis (Lytta vesicatoria). Par conséquent, il est recommandé de séparer la prise de ce produit avec le café par au moins 20 minutes.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Cardi-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80007160*
Composition : 1 comprimé cont. : Spigelia anthelmia D4 60 mg; Arnica montana D4, Cactus D4, Gelsemium sempervirens D4, Kalium carbonicum D4, Glonoinum D5, Sulfur D12 30 mg chaque.
Indications : douleurs au niveau de la poitrine qui ne sont pas d'origine cardiaque incluant les douleurs référées vertébrales.
Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica.

Effets secondaires : des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire dans certains cas isolés chez des personnes hypersensibles aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites (Arnica).
Mentions de risque : si vous êtes essoufflé, si vous éprouvez une douleur dans la région du cœur, possiblement rayonnant aux bras, à la partie supérieure de l'abdomen ou à la gorge, ou si vos symptômes sont associés à de l'anxiété, des nausées, des vomissements, ou des sueurs, consulter un médecin immédiatement. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Causticum compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004725*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Causticum Hahnemanni D3, Arnica montana D4, Pulsatilla D6, Natrum oxalaceticum D8, alpha-ketoglutaricum acidum D10, Arsenicum album D10, Embryo suis D10, Fumaricum acidum D10, Sulfur D12, Histaminum D18 22 mg chaque.
Indications : comme traitement adjuvant en cas de brûlures de tous genres; états d'épuisements.
Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica.
Effets secondaires : dans des cas individuels, des réactions d'hypersensibilité sont possibles chez les personnes qui sont hypersensibles aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites (Arnica).
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Causticum compositum

:: GOUTTES *DIN-HM 80004072*

Composition : 100 ml cont. : Causticum Hahnemanni D3, Arnica montana D4, Pulsatilla D6, Natrum oxalaceticum D8, alpha-ketoglutaricum acidum D10, Arsenicum album D10, Embryo suis D10, Fumaricum acidum D10, Sulfur D12, Histaminum D18 1 g chaque.

Indications : comme traitement adjuvant en cas de brûlures de tous genres; états d'épuisements.

Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica.

Effets secondaires : dans des cas individuels, des réactions d'hypersensibilité sont possibles chez les personnes qui sont hypersensibles aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites (Arnica).

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Ceanothus-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80003797*

Composition : 100 ml cont. : Ceanothus americanus D10, Ceanothus americanus D30, Ceanothus americanus D200, Lachesis mutus D10, Lachesis mutus D30, Lachesis mutus D200 0,5 g chaque.

Indications : syndrome épigastrique.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Cerebrum compositum *Bientôt disponible*

:: COMPRIMÉS *NPN à venir*

Composition : 1 comprimé cont. :

Ingrédients médicinaux homéopathiques : Aesculus hippocastanum D4, Cinchona pubescens D4, Cocculus D4, Ruta graveolens D4, Aconitum napellus D6, Anacardium D6, Gelsemium sempervirens D6, Hyoscyamus niger D6, Kalium phosphoricum D6, Thuja occidentalis D6, Ignatia D8, Kalium bichromicum D8, Acidum phosphoricum D10, Embryo suis D10, Hepar suis D10, Magnesium phosphoricum D10, Placenta totalis suis D10, Selenium D10, Sulfur D10, Conium maculatum D12, Arnica montana D28 1 mg chaque.

Ingrédients médicinaux organothérapiques : tous les organes proviennent de Sus scrofa domesticus (cochon domestique) : Cerebrum suis (cerveau) D8 1 mg.

Indications : peut améliorer la mémoire, la concentration et la vigilance. Peut être bénéfique pour les fonctions cognitives, qui tendent à diminuer avec l'âge, y compris la mémoire, l'apprentissage, les compétences volontaires et la concentration. Peut aussi être utilisé dans la neurasthénie et la fatigue due aux troubles nerveux, et comme traitement d'appoint après une commotion cérébrale et dans le traitement des névralgies.

Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions d'hypersensibilité, telles que des allergies cutanées ou de la fièvre, peuvent se produire après l'utilisation de produits contenant de la quinine. Dans de tels cas, consultez un praticien en soins de santé. Note : une sensibilisation à la quinine ou quinidine peut se produire.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Chelidonium-Homaccord[MD] N

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80011416*

Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus D200 6,6 mg chaque; Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000 3,3 mg chaque.

Indications : coliques biliaires, cholécystite, angiocholite, lésions hépatiques, hépatite aiguë et chronique, traitement adjuvant pour les arythmies cardiaques.

Contre-indications : en raison de son contenu en Chélidoine (Chelidonium), ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.

Mentions de risque : malgré que les bienfaits puissent être ressentis rapidement, ce produit peut être pris sur une base prolongée. Si vous prenez ce produit sur une période prolongée (quelques mois ou plus), consultez un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Chelidonium-Homaccord[MD] N

:: GOUTTES *DIN-HM 80003431*
Composition : 100 ml cont. : Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus D200 0,6 g chaque, Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000 0,3 g chaque.
Indications : coliques biliaires, cholécystite, angiocholite, lésions hépatiques, hépatite aiguë et chronique, traitement adjuvant pour les arythmies cardiaques.
Contre-indications : en raison de son contenu en Chélidoine (Chelidonium), ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois). Malgré que les bienfaits puissent être ressentis rapidement, ce produit peut être pris sur une base prolongée. Si vous prenez ce produit sur une période prolongée (quelques mois ou plus), consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

China-Homaccord[MD] S

:: GOUTTES *DIN-HM 80019371*
Composition : 100 ml cont. : Cinchona pubescens D2, Cinchona pubescens D10, Cinchona pubescens D30, Cinchona pubescens D200 0,6 g chaque; Sepia D6, Sepia D30, Sepia D200, Sepia D1000 0,4 g chaque.
Indications : états d'épuisement et de faiblesse, traitement thérapeutique de base de l'ostéochondrose.
Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité sont possibles, telles que des allergies cutanées ou une fièvre, suite à l'absorption de produits contenant de la quinine. Dans de tels cas, consulter un médecin. Note : une sensibilisation à la quinine ou la quinidine est possible.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Cimicifuga-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80020865*
Composition : 100 ml cont. : Cimicifuga racemosa D2, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200 0,8 g chaque; Strontium carbonicum D8, Strontium carbonicum D30, Strontium carbonicum D200 0,2 g chaque.
Indications : douleur résultant de l'ostéochondrose (de la colonne vertébrale complète, mais particulièrement au niveau cervical); névralgies intervertébrales.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Circulo-Injeel[MD] N

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80022463*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Secale cornutum D6, Secale cornutum D10, Secale cornutum D30, Secale cornutum D200 3,3 mg chaque; Argentum metallicum D10, Argentum metallicum D30, Argentum metallicum D200, Arsenicum album D10, Arsenicum album D30, Arsenicum album D200, Barium iodatum D10, Barium iodatum D30, Barium iodatum D200, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200, Solanum nigrum D10, Solanum nigrum D30, Solanum nigrum D200, Tabacum D10, Tabacum D30, Tabacum D200 1,1 mg chaque.
Indications : troubles circulatoires périphériques; paresthésie des doigts et orteils.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.

Mentions de risque : consulter un praticien en soins de santé avant d'administrer chez un enfant de moins de 12 ans. En raison d'un manque d'expérience documenté, ce produit ne devrait être utilisé durant la grossesse ou l'allaitement qu'après consultation avec un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Cocculus-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 01988204*
Composition : 100 ml cont. : Cocculus D4, Cocculus D10, Cocculus D30, Cocculus D200, Petroleum rectificatum D6, Petroleum rectificatum D10, Petroleum rectificatum D30, Petroleum rectificatum D200 0,5 g chaque.
Indications : mal des transports, états d'épuisement après le surmenage.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Colchicum compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007593*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Conium maculatum D4, Galium aparine D4, Hydrastis canadensis D4, Podophyllum peltatum D4, Colchicum autumnale D6 22 mg chaque.
Indications : comme thérapie auxiliaire pré et postopératoire en cas de néoplasie.
Contre-indications : ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Pour rire & sourire à pleines dents

Traitez les symptômes multiples chez les enfants • Soulagez la douleur reliée à l'otite

Viburcol[MD] est un médicament pour enfants efficace qui s'attaque à un éventail de symptômes et soulage la douleur associée aux poussées dentaires, les coliques, les infections accompagnées ou non de fièvre, l'insomnie et l'agitation.

Traumeel[MD] S en gouttes otiques soulagent la douleur associée à l'otite (moyenne et externe), aux maux d'oreilles et à l'inflammation de l'oreille. Les gouttes sont appliquées localement afin de procurer un soulagement rapide.

Quelques produits complémentaires pour la santé des enfants :

- Traumeel[MD] S
- Spascupreel[MD]
- Vertigoheel[MD]
- Oculoheel[MD]

www.heel.ca

-Heel

Colocynthis-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80014765*
Composition : 100 ml cont. : Gnaphalium polycephalum D1, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum D200 0,2 g chaque; Colocynthis D2, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200 0,8 g chaque.
Indications : névralgies, en particulier, dans la région du nerf sciatique et ostéochondrose, particulièrement dans la région lombaire de la colonne vertébrale.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Cralonin[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM à venir*
Composition : 100 ml cont. : Crataegus Ø 70 g; Spigelia anthelmia D2, Kalium carbonicum D3 1 g chaque.
Indications : insuffisance cardiaque, conséquences de dommages au myocarde, désordres cardiaques d'origine nerveuse, douleur cardiaque intense, et autres types de douleurs cardiaques (par ex. troubles de type angineux).
Mentions de risque : contient 45 vol.-% alcool. Une aggravation homéopathique initiale pourrait, dans certains cas isolés, causer de façon transitoire un rougissement du visage, de la tachycardie et une augmentation du battement cardiaque, de l'œdème, des étourdissements, de la nausée ou des dérangements légers de l'estomac. Si vous éprouvez un essoufflement ou une douleur dans la région du cœur, possiblement rayonnant aux bras, à la partie supérieure de l'abdomen ou à la gorge, ou si vos symptômes sont associés à de l'anxiété, de la nausée, des vomissements, ou des sueurs et qu'il n'y a aucune amélioration à l'intérieur de la demi-heure, consultez immédiatement un médecin. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque, n'utilisez pas ce produit sans avoir consulté votre médecin. Ne pas utiliser Cralonin comme substitut aux médicaments prescrits par votre médecin. Utiliser ce produit sous la supervision d'un praticien en soins de santé. L'utilisation des dosages aigus durant une période prolongée doit être suivie par un praticien en soins de santé ou un médecin.
N.B. : durant l'entreposage une floculation peut survenir. L'efficacité de la préparation n'en est pas affectée.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 à 20 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Cruroheel S

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80013011*

Composition : 1 comprimé cont. : Hamamelis virginiana D4 60mg; Apis mellifica D4, Lycopodium clavatum D4 30 mg chaque; Pulsatilla D6 60 mg; Silicea D6 30 mg; Carbo vegetabilis D8 60 mg; Mercurius praecipitatus ruber D8 30 mg.

Indications : suppurations fistulaires, ulcères variqueux.

Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Detox-Kit[MD]

DIN-HM à venir

:: BERBERIS-HOMACCORD[MD] GOUTTES
:: LYPHOSOT[MD] GOUTTES
:: NUX VOMICA-HOMACCORD[MD] GOUTTES

Composition : se référer à la description individuelle des préparations.

Indications : stimulation du processus de détoxication via les systèmes lymphatique, gastro-intestinal, hépatique, biliaire et rénal.

Contre-indications : se référer à la description individuelle des préparations.

Effets secondaires : se référer à la description individuelle des préparations.

Mentions de risque : se référer à la description individuelle des préparations.

Mode d'emploi : mettre 30 gouttes de chaque préparation dans 0,75 – 1,5 l d'eau de source, mélanger en inversant la bouteille et boire au cours de la journée. Durée de traitement suggérée : prendre 1 Detox-Kit pour approximativement 3 semaines, faire une pause de 1 semaine et prendre 1 autre Detox-Kit.

Présentation : emballage contenant Berberis-Homaccord[MD] 30 ml, Lyphosot[MD] 30 ml et Nux vomica-Homaccord[MD] 30 ml.

Diarrheel SN

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80005861*

Composition : 1 comprimé cont. : Veratrum album D4, Colchicum autumnale D6, Colocynthis D6, Podophyllum peltatum D6, Argentum nitricum D8, Arsenicum album D8, Mercurius sublimatus corrosivus D8 30 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique utilisée pour le traitement de la diarrhée aiguë et chronique; de la gastroentérite.

Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse.

Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Durée d'utilisation recommandée : consulter un praticien en soins de santé si les symptômes s'aggravent ou si la diarrhée persiste plus de 48 heures, si la diarrhée est en présence de fièvre, ou s'il y a du sang ou du mucus dans les selles. Boire beaucoup de liquides clairs, en particulier les bébés, enfants et personnes âgées, afin de prévenir la déshydratation causée par la diarrhée.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Droperteel

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003308*

Composition : 1 comprimé cont. : Drosera D4 90 mg; Coccus cacti D4 30 mg; Carbo vegetabilis D12, Lachesis mutus D12 75 mg chaque; Kalium carbonicum D12 30 mg.

Indications : bronchites d'origines diverses, coqueluche (adjuvant).

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Durée d'utilisation recommandée : si vous faites de la fièvre depuis plus de 3 jours ou qui est supérieure à 39°C, si votre toux est accompagnée de phlegme ou de sang, si vous êtes essoufflé, si vos symptômes persistent ou sont non identifiés, consultez votre médecin.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Drosera-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80019725*

Composition : 100 ml cont. : Drosera D2, Drosera D10, Drosera D30, Drosera D200, Cuprum aceticum D4, Cuprum aceticum D10, Cuprum aceticum D30, Cuprum aceticum D200 0,5 g chaque.

Indications : coqueluche, bronchiolite, asthme bronchique.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Duodenoheel

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80002346*

Composition : 1 comprimé cont. : Robinia pseudoacacia D4 60 mg; Anacardium D4, Ipecacuanha D4 30 mg chaque; Petroleum rectificatum D6 60 mg; Argentum nitricum D6, Iodum D6 30 mg chaque; Lachesis mutus D12 60 mg.

Indications : préparation homéopathique pour le traitement des désordres duodénaux (p. ex. duodénite) et de l'hyperacidité (tel que gastrite et dyspepsie).

Contre-indications : ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous allaitez, chez les bébés ou jeunes enfants (5 ans ou moins). Hypersensibilité à l'iode. Ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.

Mentions de risque : si vous notez la présence de sang dans vos selles (selles noires), si vos symptômes durent depuis plus d'une semaine ou s'ils sont non identifiés, consultez un médecin. Ces symptômes pourraient être dus à une condition nécessitant une clarification ou un traitement médical.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Echinacea comp.-Heel

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80016770*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Aconitum napellus D3, Arnica montana D4, Baptisia tinctoria D4, Rhus toxicodendron D4, Echinacea D5, Sanguinaria canadensis D5, Bryonia D6, Eupatorium perfoliatum D6, Euphorbium D6, Gelsemium sempervirens D6, Phytolacca D6, Argentum nitricum D8, Arsenicum album D8, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Phosphorus D8, Pulsatilla D8, Sulfur D8, Thuja occidentalis D8, Hepar sulfuris calcareum D10, Lachesis mutus D10, Zincum metallicum D10, Cortisone aceticum D13 22 mg chaque.
Indications : stimulation des défenses intrinsèques de l'organisme en cas de fièvres et d'inflammation, infections de types grippales, pharyngites, furoncles, abcès, phlegmons, toxicoses focales, gingivite, stomatite, sinusite, gastroentérite, entérocolite, cystite, pyélite, vaginite, leucorrhée, annexite, glomérulonéphrite, suppuration fistulaire, ostéomyélite, otite moyenne, abcès cérébral chronique, méningite, anthrax, mononucléose, maladies de la peau, mastite, encéphalite post vaccinale.
Contre-indications : en raison de son contenu en sanguinaire (Sanguinaria canadensis), ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Hypersensibilité à l'Arnica ou à l'herbe à puce.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir en raison de l'ingrédient Mercurius sublimatus corrosivus. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Dans de très rares cas, des troubles gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent survenir, même plusieurs jours après son utilisation. Dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire chez des personnes hypersensibles aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites (p.ex. Arnica).
Mentions de risque : si vos symptômes persistent plus de 3 jours ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé car un suivi médical pourrait être nécessaire. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Echinacea compositum

:: COMPRIMÉS *DIN-HM à venir*
Composition : 1 comprimé cont. : Echinacea D2 0,9 mg; Bryonia D4, Phytolacca D4, Rhus toxicodendron D4, Thuja occidentalis D4, Chamomilla D6, Hepar sulfuris calcareum D8, Lachesis mutus D10 0,3 mg chaque.

Indications : stimulation des mécanismes de défense propres du corps dans les cas d'inflammation localisée, par ex. dans les régions du cou, du nez et de la gorge (amygdalite, rhinite, sinusite, pharyngite, laryngite). Pour des blessures mineures, avec une tendance à l'inflammation, également pour les affections de la peau telles que les furoncles.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites telles que l'échinacée et la chamomille ou au genre Rhus de la famille des Anacardiacées tel que le Rhus toxicodendron.
Effets secondaires : dans certains cas isolés, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire telles que des dérangements gastro-intestinaux ou des réactions cutanées. Une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Engystol[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80024618*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Sulfur D4, Sulfur D10 3,3 mg chaque; Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 6,6 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour soulager les symptômes tels que douleurs, courbatures, fièvre, somnolence et maux de tête souvent associés aux cas de rhumes, d'influenza et de gastroentérites.
Effets secondaires : dans certains cas individuels des réactions cutanées peuvent survenir après usage. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit et consulter un praticien en soins de santé.
Mentions de risque : si votre fièvre persiste plus de 48 heures ou si vos symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, ⅓ ampoule (0,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅓ ampoule (0,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Engystol[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80024567*

Composition : 1 comprimé cont. : Sulfur D4, Sulfur D10 37,5 mg chaque; Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique pour soulager les symptômes tels que douleurs, courbatures, fièvre, somnolence et maux de tête souvent associés aux cas de rhumes, d'influenza et de gastroentérites.

Effets secondaires : dans certains cas individuels des réactions cutanées peuvent survenir après usage. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit et consulter un praticien en soins de santé.

Mentions de risque : si votre fièvre persiste plus de 48 heures ou si vos symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, ½ comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 4 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Euphorbium comp.[MD] SN

:: GOUTTES *DIN-HM 80013021*

Composition : 100 ml cont. : Pulsatilla D2, Euphorbium D3, Luffa operculata D6, Mercurius bijodatus D8, Argentum nitricum D10, Hepar sulfuris calcareum D10 1 g chaque.

Indications : préparation homéopathique pour soulager l'inflammation chronique des sinus paranasaux (sinusite); pour réduire le catarrhe de la trompe d'Eustache.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Euphorbium comp.[MD]

Disponible jusqu'à écoulement de l'inventaire

:: VAPORISATEUR NASAL *DIN-HM 80012891*

Composition : 100 ml cont. : Luffa operculata D2, Pulsatilla D2, Euphorbium D4, Mercurius bijodatus D8, Mucosa nasali suis D8, Argentum nitricum D10, Hepar sulfuris calcareum D10, Sinusitisinum D13 1 g chaque.

Indications : rhinites d'origines diverses (virales, bactériennes, allergiques); rhinites sèches, hyperplastiques et atrophiques, pour le traitement auxiliaire de l'ozène, pour faciliter la respiration nasale en cas de rhume des foins; sinusite (aiguë ou chronique).

Contre-indications : hypersensibilité au chlorure de benzalkonium.

Effets secondaires : des réactions allergiques peuvent se produire dans des cas isolés. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Dans de très cares cas, chez les patients asthmatiques prédisposés, des bronchospasmes peuvent se produire.

Mentions de risque : pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé. Il n'est pas recommandé de partager ce produit avec d'autres personnes.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 à 2 vaporisation(s) dans chaque narine 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), 1 vaporisation dans chaque narine 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), 1 vaporisation dans chaque narine 3 fois par jour.

Présentation : vaporisateur doseur de 20 ml.

Euphorbium comp.[MD] SN *Nouvelle formulation*

:: VAPORISATEUR NASAL *DIN-HM à venir*

Composition : 100 ml cont. : Luffa operculata D2, Pulsatilla D2, Euphorbium D4, Mercurius bijodatus D8, Argentum nitricum D10, Hepar sulfuris calcareum D10 1 g chaque.

Indications : préparation homéopathique pour traiter les rhinites d'origines diverses (virales, bactériennes ou allergiques) et les sinusites (chroniques et aiguës).

Effets secondaires : des réactions allergiques peuvent se produire dans des cas isolés. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.

Mentions de risque : si vous avez une enflure faciale, de la fièvre, des maux de têtes intenses, si vos symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé. Il n'est pas recommandé de partager ce produit avec d'autres personnes.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 à 2 vaporisation(s) dans chaque narine 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 à 2 vaporisations dans chaque narine toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 8 fois durant la première journée. Ensuite reprendre le dosage général. Enfants (6 à 12 ans), 1 vaporisation dans chaque narine 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 vaporisation dans chaque narine toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 6 fois pendant la première journée. Ensuite reprendre le dosage général. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général 1 vaporisation dans chaque narine 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 vaporisation dans chaque narine toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 4 fois pendant la première journée. Ensuite reprendre le dosage général.

Présentation : vaporisateur doseur de 20 ml.

Ferrum-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80020128*

Composition : 100 ml cont. : Spiraea ulmaria D2, Spiraea ulmaria D10, Spiraea ulmaria D30, Spiraea ulmaria D200 0,45 g chaque; Ferrum sesquichloratum solutum D4, Ferrum sesquichloratum solutum D10, Ferrum sesquichloratum solutum D30, Ferrum sesquichloratum solutum D200 0,05 g chaque; Ferrum sulfuricum D6, Ferrum sulfuricum D10, Ferrum sulfuricum D30, Ferrum sulfuricum D200 0,1 g chaque; Ferrum metallicum D8, Ferrum metallicum D30, Ferrum metallicum D200, Ferrum phosphoricum D8, Ferrum phosphoricum D30, Ferrum phosphoricum D200 0,2 g chaque.

Indications : syndrome de la coiffe des rotateurs; épicondylite.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Galium-Heel[MD] S

:: GOUTTES *DIN-HM 80020215*

Composition : 100 ml cont. : Betula pendula D4, Caltha palustris D4, Clematis recta D4, Hedera helix D4, Juniperus communis D4, Ononis spinosa D4, Sedum acre D4, Sempervivum tectorum D4, Thuja occidentalis D4 5 g chaque; Galium aparine D4 4 g; Urtica urens D4 2 g; Echinacea D5, Acidum nitricum D6, Argentum metallicum D8, Calcium fluoratum D8, Phosphorus D8, Aurum metallicum D10, Apis mellifica D12 5 g chaque.

Indications : pour supporter le mécanisme de défense non-spécifique, particulièrement dans les cas de maladies chroniques.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Gastricumeel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80002951*
Composition : 1 comprimé cont. : Nux vomica D4, Pulsatilla D4, Stibium sulfuratum nigrum D6, Carbo vegetabilis D6 60 mg chaque; Argentum nitricum D6, Arsenicum album D6 30 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour aider à soulager la gastrite aiguë et chronique, les brûlements d'estomac et les ballonnements abdominaux.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Gelsemium-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80011886*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Gelsemium sempervirens D4, Gelsemium sempervirens D10, Gelsemium sempervirens D30, Gelsemium sempervirens D200 4,4 mg chaque; Cimicifuga racemosa D4, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200, Rhus toxicodendron D5, Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Rhus toxicodendron D200 3,3 mg chaque.
Indications : syndrome cervical, migraine cervicale (ostéochondrose de la région cervicale de la colonne vertébrale), névralgies à divers endroits.
Contre-indications : hypersensibilité à Rhus toxicodendron (herbe à puce).
Effets secondaires : dans de très rares cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même quelques jours après l'utilisation.
Mentions de risque : pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Gelsemium-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80014284*
Composition : 100 ml cont. : Gelsemium sempervirens D2, Gelsemium sempervirens D10, Gelsemium sempervirens D30, Gelsemium sempervirens D200 0,4 g chaque; Cimicifuga racemosa D2, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200, Rhus toxicodendron D3, Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Rhus toxicodendron D200 0,3 g chaque.
Indications : syndrome cervical, migraine cervicale (ostéochondrose de la région cervicale de la colonne vertébrale), névralgies à divers endroits.
Contre-indications : hypersensibilité à Rhus toxicodendron (herbe à puce).
Effets secondaires : dans de très rares cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même quelques jours après l'utilisation.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Glyoxal compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *NPN à venir*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Glyoxalum D10, Methylglyoxalum D10 22 mg chaque.
Indications : stimulation des mécanismes de défense contre les toxines dans les systèmes enzymatiques bloqués et dysfonctionnels, fonctions glandulaires perturbées, maladies dégénératives (phases cellulaires). En préparation des phases d'imprégnation, de dégénérescence et de dédifférenciation.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) 1-3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Graphites-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80019710*
Composition : 100 ml cont. : Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200, Graphites D10, Graphites D30, Graphites D200 0,5 g chaque.
Indications : eczéma, particulièrement sec ou chronique; traitement à long terme des cicatrices et des chéloïdes.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). L'utilisation prolongée de cette préparation (durant plusieurs mois) doit être suivi par un praticien en soins de santé.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Gripp-Heel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004732*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Eupatorium perfoliatum D2 1,1 mg, Aconitum napellus D3 4,4 mg, Bryonia D3 2,2 mg, Phosphorus D4 1,1 mg, Lachesis mutus D11 2,2 mg.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager les symptômes reliés à la fièvre, le rhume et la grippe (influenza) et stimuler les défenses propres à l'organisme.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : en cas de symptômes prolongés tels qu'un essoufflement, une expectoration suppurative, une douleur due à la respiration, ou si vous faites de la fièvre depuis plus de 3 jours ou qui est supérieure à 39°C, consultez un médecin.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Gripp-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80004300*
Composition : 1 comprimé cont. : Eupatorium perfoliatum D3 30 mg, Aconitum napellus D4 120 mg, Bryonia D4 60 mg, Phosphorus D5 30 mg, Lachesis mutus D12 60 mg.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager les symptômes reliés à la fièvre, le rhume et la grippe (influenza) et stimuler les défenses propres à l'organisme.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Durée d'utilisation recommandée : en cas de symptômes prolongés tels qu'un essoufflement, une expectoration suppurative, une douleur due à la respiration, ou si vous faites de la fièvre depuis plus de 3 jours ou qui est supérieure à 39°C, consultez un médecin.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Gynäcoheel N

:: GOUTTES *DIN-HM 80004480*
Composition : 100 ml cont. : Viburnum opulus D2, Melilotus officinalis D3 5 g chaque; Ammonium bromatum D4, Apis mellifica D4, Helonias dioica D4, Lilium tigrinum D4, Vespa crabro D4, Aurum iodatum D12, Palladium metallicum D12, Platinum metallicum D12 10 g chaque.
Indications : maladie inflammatoire pelvienne, par ex., annexite (ovarite, salpingite), paramétrite, myométrite, endométrite, vaginite.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical. Ne pas utiliser dans les cas d'hypersensibilité au venin d'abeille, de guêpe ou de frelon.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool.
Mode d'emploi : femmes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Hamamelis-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80019796*
Composition : 100 ml cont. : Hamamelis virginiana D2, Hamamelis virginiana D30, Hamamelis virginiana D200 0,8 g chaque; Carduus marianus D6, Carduus marianus D30, Carduus marianus D200 0,2 g chaque.
Indications : stase veineuse, eczéma variqueux, thrombophlébite, ulcères de jambe inférieure.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas d'hypersensibilité à Carduus marianus ou à d'autres plantes de la famille des (Astéracées) marguerites.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. L'utilisation prolongée de cette préparation (durant plusieurs mois) doit être suivie par un thérapeute. En raison d'un manque d'expérience documentée, l'utilisation de ce produit, durant la grossesse ou l'allaitement ne doit se faire qu'après consultation avec un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Hepar comp. Heel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *NPN à venir*

Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Carduus marianus D3, Cinchona pubescens D4, Cyanocobalaminum D4, Lycopodium clavatum D4, Taraxacum officinale D4, Veratrum album D4, Chelidonium majus D5, Avena sativa D6, Cynara scolymus D6, Oroticum acidum D6, Acidum alpha-lipoicum D8, Hepar suis D8, Acidum DL-malicum D10, alpha-ketoglutaricum acidum D10, Colon suis D10, Duodenum suis D10, Fumaricum acidum D10, Histaminum D10, Natrum oxalaceticum D10, Pancreas suis D10, Thymus suis D10, Vesica fellea suis D10, Sulfur D13, Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22 mg chaque.

Indications : stimulation de la fonction de détoxification du foie dans les cas de maladies aiguës ou chroniques du foie / de la vésicule biliaire, par ex. angiocholite et cholécystite; dans les cas de troubles fonctionnels du foie d'origine toxique causant ou résulant d'autres maladies, en cas d'hypercholestérolémie, dans les cas de dermatose et de dermite exanthémateuses toxiques, de névrodermite, et pour la stimulation de la fonction des cellules du foie.

Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas d'hypersensibilité à Carduus marianus (chardon-Marie), Taraxacum officinale (pissenlit), Cynara scolymus (artichaut) ou à d'autres plantes de la famille des (Astéracées) marguerites. En raison de son contenu en chélidoine (Chelidonium) et Veratrum, ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.

Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité sont possibles, telles que des allergies cutanées ou une fièvre, suite à l'absorption de produits contenant de la quinine. Dans de tels cas, consulter un médecin. Note : une sensibilisation à la quinine ou la quinidine est possible.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour.

Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Hepeel[MD] N

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007621*

Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Carduus marianus D1 0,55 mg; Cinchona pubescens D2, Lycopodium clavatum D2, Nux moschata D3 1,1 mg chaque; Colocynthis D5 3,3 mg; Veratrum album D5 2,2 mg; Phosphorus D5 0,55 mg; Chelidonium majus D6 1,1 mg.

Indications : préparation homéopathique pour le support d'inconforts gastro-intestinaux associés à une dysfonction hépatique légère.

Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement. Ne pas utiliser dans les cas d'une allergie connue (hypersensibilité) à l'un des ingrédients.

Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques (hypersensibilité) peuvent survenir.

Mentions de risque : une sensibilisation à la quinine ou la quinidine est possible.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Hepeel[MD] N

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80007401*
Composition : 1 comprimé cont. : Carduus marianus D2 15 mg; Cinchona pubescens D3, Lycopodium clavatum D3, Nux moschata D4 30 mg chaque; Colocynthis D6 90 mg; Veratrum album D6 60 mg; Chelidonium majus D6 30 mg; Phosphorus D6 15 mg.
Indications : préparation homéopathique pour le support d'inconforts gastro-intestinaux associés à une dysfonction hépatique légère.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas d'une allergie connue (hypersensibilité) à l'un des ingrédients. Ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.
Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques (hypersensibilité) peuvent survenir.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Hormeel[MD] SN

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80002629*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Erigeron canadensis D3, Viburnum opulus D3 0,55 mg chaque; Aquilegia vulgaris D4, Origanum majorana D4 1,1 mg chaque; Cyclamen D4, Acidum nitricum D4, Pulsatilla D4 0,55 mg chaque; Nux moschata D6 1,1 mg; Ignatia D6, Sepia D6 0,55 mg chaque; Calcium carbonicum Hahnemanni D8 1,1 mg.
Indications : perturbations du cycle menstruel, stérilité, régulation des fonctions endocrines.
Contre-indications : ne pas prendre durant la grossesse.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour.
Durée d'utilisation recommandée: malgré que les bienfaits puissent être ressentis rapidement, ce produit est conçu pour une prise à long terme.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1ml chaque).

Hormeel[MD] SNT

:: GOUTTES *DIN-HM 80003144*
Composition : 100 ml cont. : Erigeron canadensis D3, Viburnum opulus D3, Cyclamen D4, Ignatia D6, Sepia D6 5 g chaque; Nux moschata D6, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 10 g chaque.

Indications : perturbations du cycle menstruel, stérilité, régulation des fonctions endocrines.
Contre-indications : ne pas prendre durant la grossesse.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : malgré que les bienfaits puissent être ressentis rapidement, ce produit est conçu pour une prise à long terme.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Husteel[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80012946*
Composition : 100 ml cont. : Belladonna D4, Scilla D4 20 g chaque; Causticum Hahnemanni D6 30 g; Arsenum iodatum D6 20 g; Cuprum aceticum D6 10 g.
Indications : toux, bronchite spasmodique.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 12 mois), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Ignatia-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004305*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Ignatia D6, Ignatia D10, Ignatia D30, Ignatia D200, Moschus D8, Moschus D30, Moschus D200 5,5 mg chaque.
Indications : dépression (surtout exogène), symptômes paradoxaux, aphonie hystérique.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Renforcez votre système immunitaire • Luttez contre les symptômes du rhume et de la grippe

Engystol[MD] active les mécanismes de défense du corps pour renforcer sa réaction immunitaire naturelle contre les infections virales. Il protège également l'organisme contre de futures infections.

Gripp-Heel[MD] soulage les symptômes du rhume et de la grippe tels que l'écoulement nasal, le mal de gorge, la toux, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons et la fièvre bénigne.

Quelques produits complémentaires pour le rhume et la grippe :

- Euphorbium comp.[MD]
- Brocosin[MD]
- Vinceel[MD]
- Angin-Heel[MD]
- Viburcol[MD]

www.heel.ca

-Heel

Ignatia-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80007938*
Composition : 100 ml cont. : Ignatia D4, Ignatia D10, Ignatia D30, Ignatia D200, Moschus D6, Moschus D30, Moschus D200 0,5 g chaque.
Indications : dépression (surtout exogène), symptômes paradoxaux, aphonie hystérique.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Injeel[MD]-Chol

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007099*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000, Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus D200 2,2 mg chaque; Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200, Carduus marianus D10, Carduus marianus D30, Carduus marianus D200, Cinchona pubescens D10, Cinchona pubescens D30, Cinchona pubescens D200, Taraxacum officinale D10, Taraxacum officinale D30, Taraxacum officinale D200, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200 1,1 mg chaque.
Indications : cholécystite, lithiase biliaire, angiocholite, dysfonction hépatique, hépatite chronique.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas d'hypersensibilité à Carduus marianus ou autres plantes de la famille des (Astéracées) marguerites. En raison de son contenu en chélidoine (Chelidonium) et en hellébore blanc (Veratrum) ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.
Effets secondaires : dans de rare cas, des réactions d'hypersensibilité telles que des allergies cutanées ou de la fièvre peuvent survenir après une exposition à des produits contenant de la quinine. Dans de tels cas, consulter un praticien en soins de santé. Une sensibilisation à la quinine peut se produire.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Kalmia compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004148*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Asa foetida D8, Kalmia latifolia D8, Mercurius praecipitatus ruber D10 22 mg chaque.
Indications : affections des articulations et du tissu conjonctif, par ex. arthrite, arthrose, périarthrite; affections des tendons et ligaments, du périoste et du tissu conjonctif des vaisseaux; affections cardiaques (post syphilitiques); dermatose chronique.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Kalmia compositum

:: GOUTTES *DIN-HM 80008049*
Composition : 100 ml cont. : Asa foetida D8, Kalmia latifolia D8, Mercurius praecipitatus ruber D10 1 g chaque.
Indications : affections des articulations et du tissu conjonctif, par ex. arthrite, arthrose, périarthrite; affections des tendons et ligaments, du périoste et du tissu conjonctif des vaisseaux; affections cardiaques (post syphilitiques); dermatose chronique.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Presentations : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Klimakt-Heel[MD] T

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80004733*
Composition : 1 comprimé cont. : Sepia D4, Sulfur D4, Ignatia D4, Cedron D4, Sanguinaria canadensis D6 30 mg chaque; Lachesis mutus D12 90 mg; Stannum metallicum D12 60 mg.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour aider à soulager les symptômes de la ménopause (p. ex. instabilité émotionnelle, désordres du sommeil, augmentation du pouls, bouffées de chaleur, menstruations irrégulières, démangeaison et sécheresse vaginales).
Contre-indications : en raison de l'ingrédient Sanguinaria canadensis, ce produit ne doit pas être utilisé durant la grossesse ou l'allaitement.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Leptandra compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004151*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Leptandra D2, Podophyllum peltatum D3, Quassia amara D3, Arsenicum album D4, Phosphorus D6, Carbo vegetabilis D10, Niccolum metallicum D10 22 mg chaque.
Indications : stimulation des défenses endogènes de l'organisme lors du syndrome épigastrique, en particulier, dans les cas de maladies chroniques ou aiguës du foie et du pancréas, après, par ex., un excès alimentaire. Météorisme (distension abdominale), congestion de la veine porte.
Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Leptandra compositum

:: GOUTTES *DIN-HM 80003134*
Composition : 100 ml cont. : Leptandra D2, Podophyllum peltatum D3, Quassia amara D3, Arsenicum album D4, Phosphorus D6, Carbo vegetabilis D10, Niccolum metallicum D10 1 g chaque.

Indications : stimulation des défenses endogènes de l'organisme lors du syndrome épigastrique, en particulier, dans les cas de maladies chroniques ou aiguës du foie et du pancréas, après, par ex., un excès alimentaire. Météorisme (distension abdominale), congestion de la veine porte.
Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : si vous souffrez d'une jaunisse ou si vos symptômes persistent, sont non identifiés ou nouveaux, consultez votre médecin puisqu'ils pourraient nécessiter un suivi médical.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Lithiumeel

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003625*
Composition : 1 comprimé cont. : Lithium carbonicum D3, Colchicum autumnale D4, Natrium carbonicum D4 30 mg chaque; Nux vomica D6, Rhus toxicodendron D6 90 mg chaque; Ferrum phosphoricum D6 30 mg.
Indications : diathèse arthritique, rhumatismale et d'acide urique (goutte).
Contre-indications : grossesse. Hypersensibilité à Rhus toxicodendron (herbe à puce).
Effets secondaires : dans de très rare cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même quelques jours après l'utilisation.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : dans les cas aigus accompagnés, par ex., de rougeur, d'enflure ou de chaleur dans les articulations, si vous faites de la fièvre depuis plus de 3 jours ou qui est supérieure à 39°C, si vos symptômes persistent, s'aggravent sont non identifiés ou nouveaux, consultez un praticien en soins de santé car un suivi médical pourrait être nécessaire.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Luffeel[MD]

:: VAPORISATEUR NASAL *DIN-HM 80025163*

Composition : 100 ml cont. : Galphimia glauca D4, Galphimia glauca D12, Galphimia glauca D30, Luffa operculata D4, Luffa operculata D12, Luffa operculata D30 10 g chaque; Histaminum D12, Histaminum D30, Histaminum D200, Sulfur D12, Sulfur D30, Sulfur D200 5 g chaque.

Indications : préparation homéopathique utilisée pour traiter le rhume des foins.

Contre-indications : hypersensibilité au chlorure de benzalkonium.

Effets secondaires : dans de rares occasions une irritation de la muqueuse nasale avec sensation de brûlure, augmentation des sécrétions nasales et des saignements nasaux peuvent se produire, dans de tels cas, discontinuer l'utilisation et consulter un praticien en soins de santé. Il y a eu quelques cas rapportés d'éternuements, de larmoiements et d'érythème facial associé à l'utilisation de ce produit. Dans de très rare cas, chez les patients asthmatiques prédisposés, des bronchospasmes peuvent se produire.

Mentions de risque : il n'est pas recommandé de partager ce produit avec d'autres personnes.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 à 2 vaporisation(s) dans chaque narine 3-5 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 à 2 vaporisation(s) dans chaque narine toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 6 fois pendant la première journée. Ensuite reprendre le dosage général.

Présentation : vaporisateur doseur de 20 ml.

Luffeel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80004175*

Composition : 1 comprimé cont. : Aralia racemosa D1, Lobelia inflata D6, Arsenum iodatum D8, Luffa operculata D12 25 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique utilisée pour traiter le rhume des foins.

Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.

Effets secondaires : dans de rares cas, une irritation de la muqueuse nasale avec brûlure, augmentation de la sécrétion nasale et des saignements de nez peuvent se produire avec Luffeel, dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit et consultez un médecin.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Durée d'utilisation recommandée : consultez un praticien en soins de santé, si vos symptômes ne s'améliorent pas à l'intérieur de 7 à 14 jours.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Lyphosot[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80022367*
Composition : 100 ml cont. : Juglans regia D3, Myosotis arvensis D3, Scrophularia nodosa D3, Teucrium scorodonia D3, Veronica officinalis D3 5 g chaque; Geranium robertianum D4, Urtica urens D4 10 g chaque; Equisetum hyemale D4, Fumaria officinalis D4, Natrium sulfuricum D4, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5 5 g chaque; Apis mellifica D6, Fucus vesiculosus D6 10 g chaque; Sarsaparilla D6, Calcium phosphoricum D12 5 g chaque.
Indications : préparation homéopathique qui supporte le système lymphatique en augmentant le volume urinaire dans des conditions telles qu'amygdalite, enflure des glandes lymphatiques et légère rétention d'eau en augmentant le débit urinaire.
Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques peuvent survenir chez les personnes prédisposées.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Lyphosot[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80024025*
Composition : 1 comprimé cont. : Juglans regia D3, Myosotis arvensis D3, Scrophularia nodosa D3, Teucrium scorodonia D3, Veronica officinalis D3 15 mg chaque; Geranium robertianum D4, Urtica urens D4 30 mg chaque; Equisetum hyemale D4, Fumaria officinalis D4, Natrium sulfuricum D4, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5 15 mg chaque; Apis mellifica D6, Fucus vesiculosus D6 30 mg chaque; Sarsaparilla D6, Calcium phosphoricum D12 15 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique qui supporte le système lymphatique en augmentant le volume urinaire dans des conditions telles qu'amygdalite, enflure des glandes lymphatiques et légère rétention d'eau en augmentant le débit urinaire.
Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques peuvent survenir chez les personnes prédisposées.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour.Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Melilotus-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80012934*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Crataegus D2, Crataegus D10, Crataegus D30, Crataegus D200 8,8 mg chaque; Melilotus officinalis D2, Melilotus officinalis D4, Melilotus officinalis D10, Melilotus officinalis D30, Melilotus officinalis D200 2,2 mg chaque.
Indications : hypertension, pléthore.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Mercurius-Heel[MD] S

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003583*
Composition : 1 comprimé cont. : Ailanthus glandulosus D3, Echinacea D3 30 mg chaque; Belladonna D4 60 mg; Phytolacca D4, Hepar sulphuris calcareum D8 30 mg chaque; Mercurius solubilis Hahnemanni D10 90 mg; Lachesis mutus D12 30 mg.
Indications : lésions pustuleuses et suppuratives telles que les furoncles et l'anthrax. Abcès (péri) amygdalien.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites. En principe général, l'échinacée ne devrait pas être utilisée en cas de maladies systémiques progressives telles que la tuberculose, la leucémie ou des maladies de type leucémique, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif (collagénoses), les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, le SIDA, l'infection au VIH et autres maladies chroniques virales.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Dans certains cas isolés, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire. Rougeurs, démangeaisons (prurit) et dans de rares cas, de l'œdème facial, une détresse respiratoire (dyspnée), des étourdissements et une baisse de pression artérielle ont été notés après l'utilisation de produits contenant des extraits d'échinacée.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : si vous présentez de l'inflammation sévère ou une suppuration de la peau ou des amygdales, faites de la fièvre depuis plus de 3 jours ou qui est supérieure à 39 °C, consultez un médecin.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Metro-Adnex-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004697*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200 2,2 mg chaque; Pulsatilla D10, Pulsatilla D30, Pulsatilla D200, Pulsatilla D1000, Vespa crabro D10, Vespa crabro D30, Vespa crabro D200 1,65 mg chaque; Lachesis mutus D10, Lachesis mutus D30, Lachesis mutus D200, Lachesis mutus D1000, Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000, Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Lilium tigrinum D10, Lilium tigrinum D30, Lilium tigrinum D200, Mercurius sublimatus corrosivus D10, Mercurius sublimatus corrosivus D30, Mercurius sublimatus corrosivus D200 1,1 mg chaque.
Indications : maladies inflammatoires de l'appareil génital féminin, dysménorrhée, douleurs au milieu du cycle menstruel.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mode d'emploi : femmes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Mezereum-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004727*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Mezereum D4, Mezereum D10, Mezereum D15, Mezereum D30, Mezereum D200, Arsenicum album D6, Arsenicum album D10, Arsenicum album D15, Arsenicum album D30, Arsenicum album D200, Arsenicum album D1000 5,5 mg chaque.
Indications : lésions vésiculaires de la peau telles que l'eczéma vésiculaire, Herpès zoster (zona), prurit.

Mentions de risque : malgré que les bienfaits puissent être ressentis rapidement, ce produit peut être pris sur une base prolongée. Si les symptômes persistent, s'aggravent ou si vous prenez ce produit sur une période prolongée (quelques mois ou plus), consultez un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Momordica compositum N

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80002631*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Veratrum album D4, Lycopodium clavatum D6, Momordica balsamina D6, Podophyllum peltatum D6, Iodum D8, Mandragora e radice siccata D8, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Carbo vegetabilis D10, Argentum nitricum D12 22 mg chaque.
Indications : affections pancréatiques et douleurs épigastriques; effet antihomotoxique régulateur dans les cas de pancréatite et de dysfonction pancréatique.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Mucosa comp.-Heel[MD]

Bientôt disponible

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *NPN à venir*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. :
Ingrédients médicinaux homéopathiques : Ceanothus americanus D4, Hydrastis Canadensis D4, Veratrum album D4, Anacardium D6, Argentum nitricum D6, Condurango D6, Momordica balsamina D6, Oxalis acetosella D6, Pulsatilla D6, Ipecacuanha D8, Kalium bichromicum D8, Mucosa nasali suis D8, Natrum oxalaceticum D8, Phosphorus D8, Sulfur D8, Belladonna D10, Creosotum D10, Lachesis mutus D10, Mandragora e radice siccata D10, Pancreas suis D10, Nux vomica D13 22 mg chaque.

Ingrédients médicinaux organothérapiques : tous les organes proviennent de Sus scrofa domesticus (cochon domestique) : Mucosa coli suis (Muqueuse du colon) D8, Mucosa ductus choledochi suis (Muqueuse du canal cholédoque) D8, Mucosa duodeni suis (Muqueuse du duodénum) D8, Mucosa ilei suis (Muqueuse de l'iléon) D8, Mucosa jejuni suis (Muqueuse du jéjunum) D8, Mucosa oculi suis (Muqueuse de la conjonctive) D8, Mucosa oesophagi suis (Muqueuse de l'œsophage) D8, Mucosa oris suis (Muqueuse orale) D8, Mucosa pulmonis suis (Muqueuse du poumon) D8, Mucosa pylori suis (Muqueuse de la région pylorique) D8, Mucosa recti suis (Muqueuse du rectum) D8, Mucosa vesicae felleae suis (Muqueuse de la vésicule biliaire) D8, Mucosa vesicae urinariae suis (Muqueuse de la vessie) D8, Ventriculus suis (estomac) D8 22 mg chaque.
Indications : action de régulation dans les maladies des muqueuses du tractus gastro-intestinal avec ou sans ulcères, des voies respiratoires supérieures et inférieures, du tractus génito-urinaire, ainsi que de la conjonctive.
Effets secondaires : des réactions cutanées peuvent se produire dans certains cas individuels, dans de tels cas discontinuer l'utilisation du produit.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 ampoule (2,2 ml) 1-3 fois par semaine. Dans les case aigus, 1 ampoule par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Mucosa comp.-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *NPN à venir*
Composition : 1 comprimé cont. :
Ingrédients médicinaux homéopathiques: Ceanothus americanus D4, Anacardium D6, Argentum nitricum D6, Condurango D6, Hydrastis canadensis D6, Momordica balsamina D6, Oxalis acetosella D6, Pulsatilla D6, Veratrum album D6, Ipecacuanha D8, Kalium bichromicum D8, Mucosa nasalis suis D8, Phosphorus D8, Sulfur D8, Belladonna D10, Lachesis mutus D10, Mandragora e radice siccata D10, Pancreas suis D10, Creosotum D12, Nux vomica D 13 1 mg chaque.
Ingrédients médicinaux organothérapiques : tous les organes proviennent des Sus scrofa domesticus (cochon domestique) : Mucosa coli suis (Muqueuse du colon) D8, Mucosa ductus choledochi suis (Muqueuse du canal cholédoque) D8, Mucosa duodeni suis (Muqueuse du duodénum) D8, Mucosa ilei suis (Muqueuse de l'iléon) D8, Mucosa jejuni suis (Muqueuse du jéjunum) D8, Mucosa pylori suis (Muqueuse de la région pylorique) D8, Mucosa recti suis (Muqueuse du rectum) D8, Mucosa vesicae felleae suis (Muqueuse de la vésicule biliaire) D8, Mucosa vesicae urinariae suis (Muqueuse de la vessie) D8, Ventriculus suis (estomac) D8 1 mg chaque.
Indications : stimulation des défenses du corps dans les maladies des muqueuses et des catarrhes de diverses origines et localisations, par ex. dans le tube digestif avec ou sans ulcères, les régions supérieures et inférieures des voies respiratoires, les voies urinaires et la conjonctive.

Effets secondaires : des réactions cutanées peuvent se produire dans certains cas individuels, dans de tels cas discontinuer l'utilisation du produit.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 comprimé 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Naso-Heel[MD] SNT

:: GOUTTES *DIN-HM 80013024*
Composition : 100 ml cont. : Ammonium carbonicum D3, Lemna minor D3 5 g chaque; Hydrastis canadensis D4, Sticta D4 10 g chaque; Arum maculatum D4 5 g; Kalium bichromicum D5, Phosphorus D6, Hydrargyrum sulfuratum rubrum D8 10 g chaque; Mercurius bijodatus D8 5 g.
Indications : préparation homéopathique pour le traitement de la rhinite et de la sinusite aiguë ou chronique.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Neralgo-Rhem-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM à venir*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Gnaphalium polycephalum D6, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium polycephalum D30 3,3 mg chaque; Causticum Hahnemanni D10, Causticum Hahnemanni D30, Causticum Hahnemanni D200, Colchicum autumnale D10, Colchicum autumnale D30, Colchicum autumnale D200, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Ferrum metallicum D10, Ferrum metallicum D30, Lithium benzoicum D10, Lithium benzoicum D30, Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Spiraea ulmaria D10, Spiraea ulmaria D30 1,1 mg chaque.
Indications : névralgie, rhumatisme des tissus mous, douleurs arthritiques; symptômes d'une hernie discale intervertébrale.
Contre-indications : ne pas prendre durant la grossesse.
Effets secondaires : dans de très rare cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même quelques jours après l'utilisation.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Nervoheel N

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80007796*

Composition : 1 comprimé cont. : Ignatia D4, Acidum phosphoricum D4, Sepia D4 60 mg chaque; Kalium bromatum D4, Zincum valerianicum D4 30 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique pour aider à soulager les symptômes reliés à l'humeur tels que la nervosité, l'irritabilité et l'épuisement physique ou mentale.

Contre-indications : hypersensibilité au brome.

Note: Nervoheel N est préparé selon des standards pharmaceutiques. Les ingrédients naturels de Nervoheel N garantissent son excellente tolérabilité et efficacité. Deux de ces ingrédients sont responsables des caractéristiques spécifiques relatives à l'apparence et l'odeur. La variation de couleur au niveau des comprimés est due à Sepia, un ingrédient de couleur foncée et l'odeur spécifique est due à la valériane, une herbe médicinale dont l'efficacité est bien connue.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Neurexan[MD]

Bientôt disponible

:: GOUTTES *DIN-HM à venir*

Composition : 100 ml cont. : Avena sativa D2, Passiflora incarnata D2, Zincum valerianicum D4, Coffea D12 60 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique pour le traitement des troubles du sommeil et l'agitation nerveuse.

Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques sont possibles. En raison de la nature homéopathique de Neurexan, une aggravation initiale (détérioration temporaire) des symptômes est possible mais inoffensive.

Mentions de risque : contient 36 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Même si les bienfaits peuvent être ressentis dès les premiers jours, Neurexan devrait être pris pendant 6 à 8 semaines avant d'évaluer son efficacité maximale lors de troubles chroniques.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 10 gouttes 3 fois durant la soirée. Si l'insomnie persiste, 10 gouttes toutes les 15 minutes jusqu'à 3 fois de plus. Enfants (6 à 11 ans), 7 gouttes 3 fois durant la soirée. Si l'insomnie persiste, 7 gouttes toutes les 15 minutes jusqu'à 3 fois de plus. Jeunes enfants (2 à 5 ans), 5 gouttes 3 fois durant la soirée. Si l'insomnie persiste, 5 gouttes toutes les 15 minutes jusqu'à 3 fois de plus.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Dites adieu à vos allergies • Pour une vision plus claire

Luffeel[MD] soulage les symptômes allergiques saisonniers associés au rhume des foins tels que les démangeaisons nasales, la congestion nasale, l'écoulement nasal, l'éternuement de même que le larmoiement et les démangeaisons oculaires.

Les gouttes ophtalmiques Oculoheel[MD] soulagent les symptômes oculaires tels que l'inflammation et l'irritation, le larmoiement, la démangeaison, la rougeur et la conjonctivite mineure.

Quelques produits complémentaires pour les allergies et les yeux :

- Euphorbium comp.[MD]
- Lyphosot[MD]
- Hepar comp.[MD] Heel
- Traumeel[MD] S
- Detox-Kit[MD]

www.heel.ca

-Heel

Neurexan[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80004914*

Composition : 1 comprimé cont. : Avena sativa D2, Passiflora incarnata D2, Zincum valerianicum D4, Coffea D12 0,6 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique pour le traitement des troubles du sommeil et l'agitation nerveuse.

Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques sont possibles. En raison de la nature homéopathique de Neurexan, une aggravation initiale (détérioration temporaire) des symptômes est possible mais inoffensive.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois). Même si les bienfaits peuvent être ressentis dès les premiers jours, Neurexan devrait être pris pendant 6 à 8 semaines avant d'évaluer son efficacité maximale lors de troubles chroniques.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois durant la soirée. Si l'insomnie persiste, 1 comprimé toutes les 15 minutes, jusqu'à 3 fois de plus. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois durant la soirée. Si l'insomnie persiste, 1 comprimé toutes 15 minutes, jusqu'à 2 fois de plus. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois durant la soirée. Si l'insomnie persiste, ½ comprimé toutes 15 minutes, jusqu'à 3 fois de plus.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Neuro-Heel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004462*

Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Avena sativa D10, Avena sativa D30, Ignatia D10, Ignatia D30 2,2 mg chaque; Argentum nitricum D10, Argentum nitricum D30, Acidum phosphoricum D10, Acidum phosphoricum D30, Platinum metallicum D10, Platinum metallicum D30, Sepia D10, Sepia D30, Valeriana officinalis D10, Valeriana officinalis D30 1,1 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique utilisée pour le traitement de symptômes physiques causés par les troubles mentaux ou émotionnels, nervosité, épuisement émotionnel.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.

Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Nux vomica-Homaccord[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80016747*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Bryonia D4, Bryonia D6, Bryonia D10, Bryonia D15, Bryonia D30, Bryonia D200, Bryonia D1000, Nux vomica D4, Nux vomica D10, Nux vomica D15, Nux vomica D30, Nux vomica D200, Nux vomica D1000 2,2 mg chaque; Colocynthis D5, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200, Lycopodium clavatum D5, Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000 3,3 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour supporter le foie et le système gastro-intestinal et soulager des symptômes tels qu'indigestions, spasmes légers et ballonnements dus à l'abus d'aliments, d'alcool, de nicotine ou de café.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Nux vomica-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM à venir*
Composition : 100 ml cont. : Bryonia D2, Bryonia D6, Bryonia D10, Bryonia D15, Bryonia D30, Bryonia D200, Bryonia D1000, Nux vomica D2, Nux vomica D10, Nux vomica D15, Nux vomica D30, Nux vomica D200, Nux vomica D1000 0,2 g chaque; Colocynthis D3, Colocynthis D10, Colocynthis D30, Colocynthis D200, Lycopodium clavatum D3, Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g chaque.
Indications : préparation homéopathique pour supporter le foie et le système gastro-intestinal et soulager des symptômes tels qu'indigestions, spasmes légers et ballonnements dus à l'abus d'aliments, d'alcool, de nicotine ou de café.
Effets secondaires : dans de très rares cas, des symptômes bénins tels qu'une nausée légère, brûlements d'estomac, vertiges, maux de tête ou migraines peuvent survenir.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé. Consulter un praticien en soins de santé avant d'administrer à un enfant de moins de 12 ans.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 8 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Oculoheel[MD]

:: GOUTTES OCULAIRES *DIN-HM 80002283*

Composition : chaque ampoule (0,45 ml) cont. : Cochlearia officinalis D5, Echinacea D5, Euphrasia officinalis D5, Pilocarpus D5 110,7 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique pour le soulagement de la conjonctivite mineure, inflammation, irritation, sensation de brûlure, larmoiements, démangeaison, rougeur, sensation d'avoir une poussière dans l'œil et photosensibilité. Ampoule à usage unique. Ouvrir l'ampoule immédiatement avant son utilisation.

Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients médicinaux, excipients ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites.

Effets secondaires : dans des cas isolés, des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir. Des réactions allergiques locales (inflammation cutanée) ont été rapportées.

Mentions de risque : ne pas toucher l'ouverture de l'ampoule. L'ampoule ne doit être utilisée qu'une seule fois. Jeter les ampoules après utilisation, même si elles contiennent encore du liquide. N'ouvrir l'ampoule qu'immédiatement avant l'application.

Mode d'emploi : adultes et enfants de tous âges : en général, 1 goutte dans l'œil affecté 3 fois par jour. Dans les cas aigus, la posologie peut être augmentée à 1 goutte dans l'œil affecté toutes les 15 minutes pour un maximum de 3 heures.

Durée d'utilisation recommandée : si vos symptômes persistent plus de 3 jours ou s'aggravent, consultez un médecin.

Présentation : emballage de 15 ampoules stériles (0,45 ml chaque).

Oculoheel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003136*

Composition : 1 comprimé cont. : Staphysagria D4 45 mg; Apis mellifica D4 30 mg; Spigelia anthelmia D6 60 mg; Natrium chloratum D6 30 mg; Aethiops mineralis D8 15 mg; Hepar sulfuris calcareum D12, Rhus toxicodendron D12 60 mg chaque.

Indications : préparation homéopathique qui aide au traitement de la conjonctivite, la blépharite, la dacryocystite (en particulier les formes chroniques).

Effets secondaires : dans de très rare cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même quelques jours après l'utilisation.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Osteoheel S

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80014311*
Composition : 1 comprimé cont. : Asa foetida D4, Kalium iodatum D4, Natrium sulfuricum D4, Stillingia sylvatica D4 30 mg chaque; Calcium phosphoricum D6 60 mg; Aranea diadema D6, Hekla lava D6 30 mg chaque; Mercurius praecipitatus ruber D9 60 mg.
Indications : préparation homéopathique pour aider à soulager les symptômes associés à l'exostose et la périostite.
Contre-indications : ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Paeonia comp.-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80014455*
Composition : 1 comprimé cont. : Paeonia officinalis D3 120 mg; Hamamelis virginiana D3, Nux vomica D4, Sulfur D4 30 mg chaque; Graphites D6 60 mg; Nitricum acidum D8 30 mg.
Indications : fissure anale, eczéma péri-anale, hémorroïdes.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Phosphor-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80019809*
Composition : 100 ml cont. : Paris quadrifolia D6, Paris quadrifolia D10, Paris quadrifolia D30, Paris quadrifolia D200, Argentum nitricum D10, Argentum nitricum D30, Argentum nitricum D200 0,3 g chaque; Phosphorus D10, Phosphorus D30, Phosphorus D200 0,4 g chaque.
Indications : enrouement, laryngite, pharyngite, hémorragies pétéchiales.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). L'utilisation prolongée de cette préparation (durant plusieurs mois) doit être suivi par un praticien en soins de santé.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Plantago-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80014497*
Composition : 100 ml cont. : Plantago major D2, Plantago major D10, Plantago major D15, Plantago major D30, Plantago major D200 0,6 g chaque; Belladonna D3, Belladonna D10, Belladonna D15, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000, Ignatia D4, Ignatia D10, Ignatia D30, Ignatia D200 0,2 g chaque.
Indications : énurésie nocturne, incontinence urinaire, cystalgie.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Pour un usage prolongé (durant quelques mois), consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : malgré que les bienfaits puissent être ressentis rapidement, ce produit est conçu pour une utilisation prolongée.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Podophyllum compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80013027*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Podophyllum peltatum D2, Podophyllum peltatum D10, Ignatia D3, Acidum hydrochloricum D4, Acidum hydrochloricum D10, Mercurius sublimatus corrosivus D8 22 mg chaque.
Indications : hémorroïdes; colites à décharge mucoïde, telles que dans les maladies inflammatoires de l'intestin; soutien pré et postopératoire en chirurgie de néoplasies du côlon.
Contre-indications : ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement.
Effets secondaires : des réactions allergiques ou une sialorrhée (salivation excessive) en raison de l'ingrédient Mercurius sublimatus corrosivus peuvent survenir. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois). Une clarification de votre condition médicale est nécessaire avant de débuter un traitement avec ce produit. Si vos symptômes persistent, s'aggravent, sont non identifiés, s'il y a du sang dans les selles, ou de la fièvre, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Podophyllum compositum

:: GOUTTES *DIN-HM 80015402*
Composition : 100 ml cont. : Podophyllum peltatum D2, Podophyllum peltatum D10, Ignatia D3, Acidum hydrochloricum D4, Acidum hydrochloricum D10, Mercurius sublimatus corrosivus D8 1 g chaque.
Indications : hémorroïdes; colites à décharge mucoïde, telles que dans les maladies inflammatoires de l'intestin; soutien pré et post-opératoire en chirurgie de néoplasies du côlon.
Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement.
Effets secondaires : des réactions allergiques ou une sialorrhée (salivation excessive) en raison de l'ingrédient Mercurius sublimatus corrosivus peuvent survenir. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois). Une clarification de votre condition médicale est nécessaire avant de débuter un traitement avec ce produit. Si vos symptômes persistent, s'aggravent, sont non identifiés, s'il y a du sang dans les selles, ou de la fièvre, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Pulsatilla compositum

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80006830*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Pulsatilla D6, Sulfur D8, Cortisone aceticum D18 22 mg chaque.

Indications : activation du système de défense du mésenchyme, en particulier la fonction des tissus conjonctifs; augmenter l'efficacité des préparations biologiques pour injection et en traitement des phases cellulaires; réactivation des systèmes de défense endommagés, aussi en postopératoire.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Pulsatilla compositum E

:: GOUTTES *DIN-HM 80019373*
Composition : 100 ml cont. : Pulsatilla D6, Sulfur D8, Cortisone aceticum D18 10 g chaque.
Indications : activation du système de défense du mésenchyme, en particulier la fonction des tissus conjonctifs; augmenter l'efficacité des préparations biologiques pour injection et en traitement des phases cellulaires; réactivation des systèmes de défense endommagés, aussi en postopératoire.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, 3 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Ranunculus-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80012887*
Composition : 100 ml cont. : Ranunculus bulbosus D2, Ranunculus bulbosus D10, Ranunculus bulbosus D15, Ranunculus bulbosus D30, Ranunculus bulbosus D200, Asclepias tuberosa D4, Asclepias tuberosa D10, Asclepias tuberosa D20, Asclepias tuberosa D30, Asclepias tuberosa D200 0,5 g chaque.
Indications : névralgies intercostales, douleur pleurétique, Herpes zoster (zona).

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Reneel NT

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003120*
Composition : 1 comprimé cont. : Sabal serrulatum D2 30 mg; Berberis vulgaris D2 15 mg; Causticum Hahnemanni D4 60 mg; Cantharis D5, Plumbum aceticum D6 30 mg chaque; Alumina D12 75 mg.
Indications : maladies inflammatoires des voies rénales avec ou sans lithiase.
Interactions avec d'autres médicaments : la littérature homéopathique rapporte que la consommation préalable ou subséquente de café (régulier ou sous forme homéopathique) peut réduire l'efficacité thérapeutique de Cantharis (Lytta vesicatoria). Par conséquent, il est recommandé de séparer la prise de ce produit avec le café par au moins 20 minutes.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : si vous notez la présence de sang dans les urines, vous faites de la fièvre ou si vos symptômes persistent plus de 5 jours, consultez un praticien en soins de santé.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Rheuma-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80013227*
Composition : 1 comprimé cont. : Arnica montana D4, Bryonia D4, Causticum Hahnemanni D4, Ferrum phosphoricum D6, Rhus toxicodendron D6 60 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour soulager la douleur associée aux rhumatismes des tissus mous et aux désordres périarthritiques.

Contre-indications : hypersensibilité au genre Rhus de la famille des Anacardiacées (herbe à puces) et à l'Arnica.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Rhododendroneel SN

:: GOUTTES *DIN-HM 80013026*
Composition : 100 ml cont. : Stellaria media D2 5 g; Rhododendron D3, Spiraea ulmaria D3 10 g chaque; Acidum benzoicum e resina D3, Lithium benzoicum D3, Pulsatilla D3 5 g chaque; Aconitum napellus D4, Dulcamara D4, Ledum palustre D4, Asclepias tuberosa D6 10 g chaque.
Indications : névralgies, rhumatismes des tissus mous et affections (péri) arthritiques avec une sensibilité aux conditions météorologiques.
Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Sabal-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80014429*
Composition : 100 ml cont. : Sabal serrulatum Ø 0,9 g; Sabal serrulatum D10, Sabal serrulatum D30 0,3 g chaque; Hepar sulfuris calcareum D10, Hepar sulfuris calcareum D15, Hepar sulfuris calcareum D30, Hepar sulfuris calcareum D200 0,7 g chaque.
Indications : premier stade de l'adénome prostatique bénin ou hypertrophie bénigne de la prostate (HBP); vessie hyperactive.
Mentions de risque : contient 45 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Schwef-Heel[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80019840*
Composition : 100 ml cont. : Sulfur D4, Sulfur D6, Sulfur D12, Sulfur D30, Sulfur D200 20 g chaque.
Indications : dermatoses et dermites d'origines diverses, telles que l'eczéma irritant, pyodermite.
Mentions de risque : contient 85 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Selenium-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80019803*
Composition : 100 ml cont. : Kalium phosphoricum D2, Kalium phosphoricum D10, Kalium phosphoricum D30, Kalium phosphoricum D200, Selenium D10, Selenium D15, Selenium D30, Selenium D200 0,5 g chaque.
Indications : diminution de la capacité mentale soit de nature cérébrale ou secondaire à l'artériosclérose.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). L'utilisation prolongée de cette préparation (durant plusieurs mois) doit être suivi par un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Reprenez le contrôle de votre instabilité émotive • Soulagez les symptômes de la ménopause

Ignatia-Homaccord[MD] atténue les symptômes liés à l'humeur tels que la tristesse, la nervosité et la lassitude. Traite les changements hormonaux et émotifs associés au SPM et à la périménopause.

Klimakt-Heel[MD] soulage les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les palpitations, les changements d'humeur, la nervosité et l'insomnie.

Quelques produits complémentaires pour la santé des femmes :

- Nervoheel[MD]
- Neurexan[MD]
- Hormeel[MD]
- Detox-Kit[MD]

www.heel.ca

-Heel

Spascupreel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80023978*

Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Passiflora incarnata D2, Chamomilla D3 0,55 mg chaque; Ammonium bromatum D4, Colocynthis D4 1,1 mg chaque; Agaricus muscarius D4 0,55 mg; Aconitum napellus D6 2,2 mg; Atropinum sulfuricum D6, Gelsemium sempervirens D6, Magnesium phosphoricum D6, Veratrum album D6 1,1 mg chaque; Cuprum sulfuricum D6 0,55 mg.

Indications : préparation homéopathique utilisée pour réduire la sévérité des spasmes des organes à musculature lisse (estomac, intestin, utérus et voies urinaires); pour soulager les spasmes et crampes douloureux de la musculature striée; pour supporter le traitement de la dysménorrhée.

Contre-indications : hypersensibilité à la Camomille ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites. Premier trimestre de la grossesse.

Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions allergiques cutanées peuvent se produire.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). En cas de grossesse ou d'allaitement, si vous avez des calculs biliaires, des conduits biliaires bloqués ou une jaunisse, utiliser seulement après avoir consulté un praticien en soins de santé.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour.

Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Spascupreel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80023679*

Composition : 1 comprimé cont. : Passiflora incarnata D2, Chamomilla D3 15 mg chaque; Ammonium bromatum D4, Colocynthis D4 30 mg chaque; Agaricus muscarius D4 15 mg; Aconitum napellus D6 60 mg; Atropinum sulfuricum D6, Gelsemium sempervirens D6, Magnesium phosphoricum D6, Veratrum album D6 30 mg chaque; Cuprum sulfuricum D6 15 mg.

Indications : préparation homéopathique utilisée pour réduire la sévérité des spasmes des organes à musculature lisse (estomac, intestin, utérus et voies urinaires); pour soulager les spasmes et crampes douloureux de la musculature striée; pour supporter le traitement de la dysménorrhée.

Contre-indications : hypersensibilité à la Camomille ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites. Premier trimestre de la grossesse.

Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions allergiques cutanées peuvent se produire.

Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). En cas de grossesse ou d'allaitement, si vous avez des calculs biliaires, des conduits biliaires bloqués ou une jaunisse, utiliser seulement après avoir consulté un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Spigelon[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80020658*
Composition : 100 ml cont. : Belladonna D3, Bryonia D3, Gelsemium sempervirens D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3, Spigelia anthelmia D3 10 g chaque; Silicea D12, Thuja occidentalis D12 20 g chaque.
Indications : maux de tête, en particulier constitutionnels.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Spigelon[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80020934*
Composition : 1 comprimé cont. : Belladonna D3, Bryonia D3, Gelsemium sempervirens D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3, Spigelia anthelmia D3 30 mg chaque; Silicea D12, Thuja occidentalis D12 60 mg chaque.
Indications : maux de tête, en particulier constitutionnels.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Strumeel forte N

:: GOUTTES *DIN-HM 80012859*

Composition : 100 ml cont. : Spongia D2 50 g; Calcium iodatum D3 30 g; Fucus vesiculosus D3, Silicea D8 10 g chaque.

Indications : goitre parenchymateux (diffus); prophylaxie du goitre, artériosclérose et autres conditions où l'iode est indiqué. Soutien de la fonction thyroïdienne.

Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.

Effets secondaires : aggravation possible de l'hyperthyroïdie.

Mentions de risque : contient 40 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.

Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Strumeel T

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80020612*

Composition : 1 comprimé cont. : Spongia D3 150 mg, Calcium iodatum D4 90 mg, Fucus vesiculosus D4 30 mg.

Indications : goitre parenchymateux (juvénile); prophylaxie du goitre, soutien de la fonction thyroïdienne.

Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas d'hypersensibilité à l'iode, d'hyperthyroïdie, ou avec des produits causant une inhibition de la fonction thyroïdienne. Ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.

Effets secondaires : peut causer une intensification de l'hyperthyroïdisme. Dans de très rares cas, des nausées, des désordres gastriques, du vertige, une augmentation de la pression sanguine ou des variations de la glycémie peuvent se produire.

Mentions de risque : en raison d'un manque d'expérience documenté, ce produit ne devrait être utilisé durant la grossesse ou l'allaitement qu'après consultation d'un praticien en soins de santé.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour.

Présentation : emballage de 50 comprimés.

Sulfur-Heel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003514*
Composition : 1 comprimé cont. : Caladium seguinum D4, Capsicum annuum D4 90 mg chaque; Sulfur D4 30 mg; Mezereum D4 15 mg; Pix liquida D6 60 mg; Arsenicum album D6 15 mg.
Indications : eczéma et dermatose. Prurit.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Tartephedreel[MD] N

:: GOUTTES *DIN-HM 80023051*
Composition : 100 ml cont. : Illicium anisatum D3 5 g; Belladonna D4, Kalium stibyltartaricum D4, Natrium sulfuricum D4 10 g chaque; Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4 5 g chaque; Arsenum iodatum D6 10 g; Blatta orientalis D6, Naphthalinum D6 5 g chaque.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager les symptômes tels que toux, respiration sifflante, congestion, râles associés à une bronchite ou à une inflammation des voies respiratoires supérieures.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Si vos symptômes persistent, s'aggravent, sont non identifiés ou nouveaux (p. ex. un manque de souffle, de la fièvre ou une toux produisant du phlegme ou du sang), consultez un praticien en soins de santé car un suivi médical pourrait être nécessaire.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Tonico-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80019059*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Nux vomica D10, Nux vomica D30 2,75 mg chaque; Kalium phosphoricum D10, Kalium phosphoricum D30 2,2 mg chaque; Aurum metallicum D10, Aurum metallicum D30, Aurum metallicum D200 1,65 mg chaque; Chininum arsenicosum D10, Chininum arsenicosum D30, Helonias dioica D10, Helonias dioica D30, Hypericum perforatum D10, Hypericum perforatum D30, Selenium D10, Selenium D30 1,1 mg chaque.
Indications : épuisement physique et mental. Perturbation du développement mental chez l'enfant.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Traumeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80005012*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Belladonna D2 2,2 mg chaque; Hamamelis virginiana D1 0,22 mg; Aconitum napellus D2 1,32 mg; Bellis perennis D2 1,1 mg; Hypericum perforatum D2 0,66 mg; Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 0,55 mg chaque; Chamomilla D3, Millefolium D3, Symphytum officinale D6, Hepar sulfuris calcareum D6 2,2 mg chaque; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 mg.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager la douleur, l'inflammation et les ecchymoses associées à des blessures telles qu'entorses, dislocations, contusions; pour soulager la douleur musculaire et articulaire.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites telles qu'Arnica, Chamomilla et Achillea millefolium. En principe, l'échinacée ne devrait pas être utilisée en cas de maladies systémiques progressives telles que la tuberculose, les leucoses, les collagénoses, la sclérose en plaque, le SIDA, l'infection au VIH et autres maladies auto-immunes.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité ou d'allergies cutanées (rougeur, enflure et prurit) peuvent se produire chez les personnes hypersensibles aux Astéracées (p. ex. Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium).

Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Une irritation cutanée, une démangeaison (prurit) et dans de rares cas de l'œdème facial, une détresse respiratoire (dyspnée), des étourdissements et une baisse de pression artérielle ont été notés après l'utilisation de produits contenant des extraits d'échinacée.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (1,4 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (1,4 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Traumeel[MD] S

:: GOUTTES *DIN-HM 80007958*
Composition : 100 ml cont. : Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2 5 g chaque; Bellis perennis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 2 g chaque; Aconitum napellus D3 10 g; Hypericum perforatum D2 1 g; Chamomilla D3 8 g; Millefolium D3 5 g; Belladonna D4 25 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulfuris calcareum D8 10 g chaque; Symphytum officinale D8 8 g.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager la douleur, l'inflammation et les ecchymoses associées à des blessures telles qu'entorses, dislocations, contusions ; pour soulager la douleur musculaire et articulaire.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des (Astéracées) marguerites telles qu'Arnica, Chamomilla et Achillea millefolium. En principe, l'échinacée ne devrait pas être utilisée en cas de maladies systémiques progressives telles que la tuberculose, les leucoses, les collagénoses, la sclérose en plaque, le SIDA, l'infection au VIH et autres maladies auto-immunes.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité ou d'allergies cutanées (rougeur, enflure et prurit) peuvent se produire chez les personnes hypersensibles aux composées (p. ex. Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium). Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Une irritation cutanée, une démangeaison (prurit) et dans de rares cas de l'œdème facial, une détresse respiratoire (dyspnée), des étourdissements et une baisse de pression artérielle ont été notés après l'utilisation de produits contenant des extraits d'échinacée.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Traumeel[MD] S

:: GOUTTES OTIQUES *DIN-HM 80021067*
Composition : 0,45 ml cont. : Arnica montana D2, Belladonna D2, Calendula officinalis D2 0,99 mg chaque; Hamamelis virginiana D1 0,099 mg; Aconitum napellus D2 0,954 mg; Bellis perennis D2 0,495 mg; Hypericum perforatum D2 0,297 mg; Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 0,2475 mg chaque; Chamomilla D3, Millefolium D3, Hepar sulfuris calcareum D6, Symphytum officinale D6 0,99 mg chaque; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,495 mg.
Indications : préparation homéopathique pour le traitement local de maux d'oreilles en général et d'inflammation de l'oreille externe ou moyenne et du canal auditif.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des marguerites (Asteraceae) telles qu'Arnica, Chamomilla et Millefolium.
Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire. Des réactions d'allergies cutanées (inflammation cutanée, rougeur, enflure et démangeaisons (prurit)) ont été rapportées. Dans de tels cas discontinuer l'utilisation du produit.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, instiller le contenu d'une ampoule directement dans l'oreille affectée jusqu'à 3 fois par jour. Dans les cas aigus, le contenu d'une ampoule toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, instiller 5 gouttes directement dans l'oreille affectée 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, instiller 4 gouttes directement dans l'oreille affectée 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 4 gouttes toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, instiller 3 gouttes directement dans l'oreille affectée 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 3 gouttes toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Mettre de la ouate à l'intérieur de l'oreille afin de prévenir la perte du liquide. Si possible, dormir sur l'oreille non affectée. Réchauffer le contenu de l'ampoule dans la paume de votre main, avant d'utiliser. Ouvrir seulement au moment de l'utilisation afin de préserver la stérilité.
Durée d'utilisation recommandée : s'il n'y a aucune amélioration après 2 jours, ou présence d'une fièvre persistante, consulter un praticien en soins de santé.
Présentation : emballage de 10 ampoules (0,45 ml chaque).

Traumeel[MD] S

:: GEL *DIN-HM 80005218*

Composition : 100 g cont. : Calendula officinalis Ø, Hamamelis virginiana Ø 0,45 g chaque; Echinacea Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla Ø 0,15 g chaque; Bellis perennis Ø 0,1 g; Millefolium Ø 0,09 g; Aconitum napellus D1, Belladonna D1 0,05 g chaque; Arnica montana D3 1,5 g; Symphytum officinale D4 0,1 g; Hypericum perforatum D6 0,09 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g; Hepar sulfuris calcareum D6 0,025 g.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager la douleur, l'inflammation et les ecchymoses associées à des blessures telles qu'entorses, dislocations, contusions; pour soulager la douleur musculaire et articulaire.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients, à Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium ou aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées).
Effets secondaires : dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire. Des réactions allergiques locales (inflammation cutanée, rougeur, enflure et prurit) ont été observées. Dans de tels cas discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : contient 25 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois). Pour usage externe seulement. Ne pas appliquer sur une grande surface du corps, sur des écorchures et éraflures ou directement sur des plaies ouvertes.
Mode d'emploi : adultes et enfants (plus de 12 mois), appliquer généreusement et masser les parties atteintes, matin et soir, ou plus souvent si nécessaire; ou appliquer un pansement au besoin.
Présentations : tube contenant 50 g ou bouteille contenant 250 g.

Traumeel[MD] S

:: POMMADE *DIN-HM 80007675*

Composition : 100 g cont.: Calendula officinalis Ø, Hamamelis virginiana Ø 0,45 g chaque; Echinacea Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla Ø 0,15 g chaque; Bellis perennis Ø 0,1 g; Millefolium Ø 0,09 g; Aconitum napellus D1, Belladonna D1 0,05 g chaque; Arnica montana D3 1,5 g; Symphytum officinale D4 0,1 g; Hypericum perforatum D6 0,09 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g; Hepar sulfuris calcareum D6 0,025 g.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager la douleur, l'inflammation et les ecchymoses associées à des blessures telles qu'entorses, dislocations, contusions; pour soulager la douleur musculaire et articulaire.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients, à Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium ou aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées).
Effets secondaires : dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité peuvent se produire. Des réactions allergiques locales (inflammation cutanée, rougeur, enflure et prurit) ont été observées. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.

Mentions de risque : contient 13,8 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Pour usage externe seulement. Ne pas appliquer sur une grande surface du corps, sur des écorchures et éraflures ou directement sur des plaies ouvertes. L'alcool cétostéaryle peut causer une réaction cutanée locale (par e.x. dermite de contact).
Mode d'emploi : adultes et enfants (plus de 2 ans), appliquer généreusement et masser les parties atteintes, matin et soir, ou plus souvent si nécessaire; ou appliquer un pansement au besoin.
Présentations : tubes contenant 50 ou 100 g.

Traumeel[MD] S

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80005063*
Composition : 1 comprimé cont. : Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2 15 mg chaque; Bellis perennis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 6 mg chaque; Aconitum napellus D3 30 mg; Hypericum perforatum D2 3 mg; Chamomilla D3 24 mg; Millefolium D3 15 mg; Belladonna D4 75 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulfuris calcareum D8 30 mg chaque; Symphytum officinale D8 24 mg.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour soulager la douleur, l'inflammation et les ecchymoses associées à des blessures telles qu'entorses, dislocations, contusions; pour soulager la douleur musculaire et articulaire.
Contre-indications : hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées) telles qu'Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium. En principe, l'échinacée ne devrait pas être utilisée en cas de maladies systémiques progressives telles que la tuberculose, les leucoses, les collagénoses, la sclérose en plaque, le SIDA, l'infection au VIH et autres maladies auto-immunes.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit. Dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité ou d'allergies cutanées (rougeur, enflure et prurit) peuvent se produire chez les personnes hypersensibles aux plantes de la famille des composées (p. ex. Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium). Dans de tels cas discontinuer l'utilisation du produit. Une irritation cutanée, une démangeaison (prurit) et dans de rares cas de l'œdème facial, une détresse respiratoire (dyspnée), des étourdissements et une baisse de pression artérielle ont été notés après l'utilisation de produits contenant des extraits d'échinacée.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentations : emballages de 50 ou 250 comprimés.

Ubicoenzyme

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80012881*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Beta vulgaris D2, Acidum citricum D8, Alpha-lipoicum acidum D8, Cerium oxalicum D8, Nadidum D8, Succinicum acidum D8 110 mg chaque; Hydrastis canadensis D4, Selenium D8, Silicea D8, Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200, Sulfur D8, Sulfur D30, Sulfur D200, Thuja occidentalis D8, Thuja occidentalis D30, Thuja occidentalis D200 22 mg chaque.
Indications : stimulation des mécanismes de défense de l'organisme contre les toxines et du métabolisme de l'énergie cellulaire. Réactivation des systèmes enzymatiques bloqués en cas de défaillance des fonctions enzymatiques et de maladies dégénératives (phases cellulaires).
Mentions de risque : pour une utilisation prolongée, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,2 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (2,2 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Valerianaheel

:: GOUTTES *DIN-HM à venir*
Composition : 100 ml cont. : Valeriana officinalis Ø 65 g; Crataegus Ø, Humulus lupulus Ø 5 g chaque; Melissa officinalis Ø 3 g; Avena sativa Ø, Chamomilla recutita Ø 2 g chaque; Hypericum perforatum D1 5 g; Ammonium bromatum D1, Kalium bromatum D1, Natrum bromatum D1 1 g chaque; Acidum picrinicum D5 10 g.
Indications : conditions d'agitation, neurasthénie.
Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement. Hypersensibilité à la camomille ou à d'autres plantes de la famille des marguerites (Asteracées). Hypersensibilité au brome.
Effets secondaires : des réactions cutanées peuvent se produire dans de rares cas.
Mentions de risque : contient 66 vol.-% alcool
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 15 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Durée d'utilisation recommandée : en raison des ingrédients bromés, consulter un praticien en soins de santé pour une utilisation prolongée (plus de 4 semaines).
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Soulagez les étourdissements et les vertiges

Vertigoheel[MD] diminue de façon significative les vertiges et soulage leurs symptômes. Idéal pour la prévention et le traitement des épisodes aigus d'étourdissement.

Quelques produits complémentaires pour l'étourdissement et les vertiges :

- Nux vomica-Homaccord[MD]
- Vomitusheel[MD]
- Aesculus compositum[MD]
- Barijodeel[MD]

www.heel.ca

-Heel

Veratrum-Homaccord[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 80021222*
Composition : 100 ml cont. : Tormentilla Ø 0,3 g; Tormentilla D10, Tormentilla D30 0,1 g chaque; Rheum D1 1,0 g; Rheum D10, Rheum D30 0,1 g chaque; Veratrum album D2, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200 0,6 g chaque; Aloe D2, Aloe D10, Aloe D30 0,2 g chaque.
Indications : gastroentérites d'origines diverses, surtout lorsqu'elles s'accompagnent de faiblesse et d'évanouissements.
Contre-indications : premier trimestre de la grossesse**.**
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Vertigoheel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80014837*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Conium maculatum D2 1,1 mg; Cocculus D3 7,7 mg; Ambra grisea D5, Petroleum rectificatum D7 1,1 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour le traitement d'étourdissements d'origines diverses.
Mentions de risque : les étourdissements peuvent être un symptôme d'une condition sérieuse. Consultez un praticien en soins de santé si les symptômes persistent, sont non identifiés ou s'aggravent.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Vertigoheel[MD]

:: GOUTTES *DIN-HM 02232005*
Composition : 100 ml cont. : Conium maculatum D3 10 g; Cocculus D4 70 g; Ambra grisea D6, Petroleum rectificatum D8 10 g chaque.
Indications : préparation homéopathique pour le traitement d'étourdissements d'origines diverses.

Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Les étourdissements peuvent être un symptôme d'une condition sérieuse. Consultez un praticien en soins de santé si les symptômes persistent, sont non identifiés ou s'aggravent.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Vertigoheel[MD]

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 01988956*
Composition : 1 comprimé cont. : Conium maculatum D3 30 mg; Cocculus D4 210 mg; Ambra grisea D6, Petroleum rectificatum D8 30 mg chaque.
Indications : préparation homéopathique pour le traitement d'étourdissements d'origines diverses.
Mentions de risque : les étourdissements peuvent être un symptôme d'une condition sérieuse. Consultez un praticien en soins de santé si les symptômes persistent, sont non identifiés ou s'aggravent.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Viburcol[MD] monodoses

:: AMPOULES BUVABLES *DIN-HM 80022252*
Composition : 1 ampoule (1 ml) cont. : Chamomilla D4, Plantago major D4 25 mg chaque; Pulsatilla D6 50 mg; Dulcamara D6 25 mg; Belladonna D6 11 mg; Calcium carbonicum Hahnemanni D8 75 mg.
Indications : préparation homéopathique pour aider au traitement des états d'agitation et infections mineures avec ou sans fièvre, douleurs telles que poussées dentaires et coliques.
Contre-indications : hypersensibilité à la camomille ou aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées).
Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques cutanées peuvent se produire.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Si les symptômes persistent plus de 3 jours ou s'aggravent, consulter un praticien en soins de la santé.

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 ampoule 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule toutes les ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toute ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), 8 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 8 gouttes toute ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toute ½ à 1 heure jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : emballage de 15 ampoules (1 ml chaque).

Viburcol[MD] N

:: SUPPOSITOIRES *DIN-HM 80022258*
Composition : 1 suppositoire cont. : Chamomilla D1 1,1 mg; Pulsatilla D2 2,2 mg; Belladonna D2, Plantago major D3 1,1 mg chaque; Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg.
Indications : préparation homéopathique pour soulager les états d'agitation, les poussées dentaires ou les coliques, avec ou sans fièvre et douleur.
Contre-indications : hypersensibilité à la camomille ou aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées).
Effets secondaires : dans de rares cas, des réactions allergiques cutanées peuvent se produire.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans). Si les symptômes ne s'améliorent pas durant les 24 prochaines heures ou s'ils s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : retirer le suppositoire de son enveloppe et insérer dans l'anus selon les dosages suivants : adultes (12 ans et plus), 1 suppositoire 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 suppositoire toutes les 1 à 2 heures jusqu'à un maximum de 6 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), 1 suppositoire 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 suppositoire toutes les 1 à 2 heures jusqu'à un maximum de 4 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), 1 suppositoire 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 suppositoire toutes les 1 à 2 heures jusqu'à un maximum de 3 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), 1 suppositoire 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 suppositoire toutes les 1 à 2 heures jusqu'à un maximum de 3 fois par jour. Après soulagement des symptômes réduire graduellement le dosage.
Présentation : emballage de 12 suppositoires (1,1 g chaque).

Vinceel[MD]

:: VAPORISATEUR POUR LA BOUCHE ET LA GORGE *DIN-HM 80022552*
Composition : 100 g cont. : Calendula officinalis D3, Phytolacca D3, Plantago major D3, Salvia officinalis D3, Belladonna D5, Echinacea purpurea D5, Vincetoxicum D5, Apis mellifica D7 1,25 g chaque.
Indications : préparation homéopathique utilisée pour calmer et soulager les maux de gorge (rouge et enflammée), la voix enrouée, l'inflammation de la muqueuse buccale et les aphtes (ulcères buccaux).

Contre-indications : consultez un praticien en soins de santé avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Hypersensibilité à l'un des ingrédients actifs, excipients ou aux plantes de la famille des marguerites (Astéracées) telles qu'Echinacea purpurea et Calendula officinalis.
Effets secondaires : dans de très rares cas, des réactions allergiques cutanées (rougeur, enflure et prurit) peuvent se produire. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : contient 20 vol.-% alcool. Vu la présence d'éthanol, ce produit ne doit pas être inhalé et n'est donc pas recommandé aux enfants de 5 ans et moins.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 vaporisation 3 à 5 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 vaporisation toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), 1 vaporisation 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 vaporisation toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Enfants (1 à 5 ans), consulter un praticien en soins de santé.
Durée d'utilisation recommandée : consulter un praticien en soins de santé si les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 3 jours.
Présentation : vaporisateur contenant 20 ml.

Viscum compositum forte

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80015147*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Viscum album Ø 88 mg; Viscum album D10, Viscum album D28, Viscum album D198, Adenosinum cyclophosphoricum D8, Mercurius iodatus flavus D10 22 mg chaque.
Indications : biothérapie en phases cellulaires. Adjuvant au traitement de la néoplasie, également en phases pré et postopératoires de la chirurgie néoplasique.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical. Les produits contenant du Viscum album ne devraient pas être utilisés dans les cas d'allergies au gui, dans les cas de maladies granulomateuses chroniques ou auto-immunes en présence d'un déséquilibre métabolique. En cas d'inflammation aiguë ou d'une fièvre élevée, interrompre le traitement jusqu'au moment où les symptômes inflammatoires aient disparu.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer le traitement.
Mentions de risque : utiliser sous la supervision d'un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 ampoule (2,2 ml) 1-3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Viscum compositum medium

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80015147*
Composition : 1 ampoule (2,2 ml) cont. : Viscum album D1 110 mg; Viscum album D10, Viscum album D28, Viscum album D198, Adenosinum cyclophosphoricum D8, Mercurius iodatus flavus D10 22 mg chaque.
Indications : biothérapie en phases cellulaires. Adjuvant au traitement de la néoplasie, également en phases pré et postopératoires de la chirurgie néoplasique.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical. Les produits contenant du Viscum album ne devraient pas être utilisés dans les cas d'allergies au gui, dans les cas de maladies granulomateuses chroniques ou auto-immunes en présence d'un déséquilibre métabolique. En cas d'inflammation aiguë ou d'une fièvre élevée, interrompre le traitement jusqu'au moment où les symptômes inflammatoires aient disparu.
Effets secondaires : une sialorrhée (salivation excessive) peut survenir suite à l'administration. Dans de tels cas, discontinuer le traitement.
Mentions de risque : utiliser sous la supervision d'un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 ampoule (2,2 ml) 1-3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,2 ml chaque).

Vomitusheel

:: GOUTTES *DIN-HM 80014075*
Composition : 100 ml cont. : Aethusa cynapium D4, Ipecacuanha D4, Nux vomica D4 10 g chaque; Ignatia D6 30 g; Colchicum autumnale D6 25 g; Apomorphinum hydrochloricum D6 15 g.
Indications : préparation homéopathique pour aider à traiter la nausée et les vomissements.
Contre-indications : ne pas utiliser durant la grossesse.
Mentions de risque : contient 35 vol.-% alcool. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 10 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 10 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 7 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 7 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, 5 gouttes 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 5 gouttes toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour.
Présentation : flacon compte-gouttes de 30 ml.

Ypsiloheel N

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80003482*
Composition : 1 comprimé cont. : Pulsatilla D4 45 mg; Asa foetida D4, Ignatia D4, Paris quadrifolia D4 30 mg chaque; Glonoinum D6 45 mg; Thuja occidentalis D6 30 mg; Lachesis mutus D8 45 mg.
Indications : dystonie neurovégétative, boule hystérique.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les ½ à 1 heure, jusqu'à 12 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, 1 comprimé 2 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 8 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ comprimé 3 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 comprimé toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à 6 fois par jour.
Présentation : emballage de 50 comprimés.

Zeel[MD] comp. N

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80015659*
Composition : 1 ampoule (2,0 ml) cont. : Rhus toxicodendron D4 10 mg; Arnica montana D4 2 mg; Dulcamara D4, Sanguinaria canadensis D4 1 mg chaque; Sulfur D10 3 mg.
Indications : préparation homéopathique pour soulager la douleur associée aux conditions arthritiques et / ou arthrosiques.
Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica et à l'herbe à puce. En raison de son contenu en Sanguinaria canadensis (sanguinaire), ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Dans les cas de patients souffrant, ou ayant déjà souffert d'une maladie hépatique ou si utilisé conjointement avec des médicaments hépatotoxiques, prendre seulement après avoir consulté un praticien en soins de santé.
Effets secondaires : durant un traitement avec des produits contenant des alcaloïdes de Sanguinaria canadensis (sanguinaire du Canada), certains cas rapportent des taux d'enzymes hépatiques élevés (transaminases) et une augmentation de la bilirubine sérique, au point d'induire une jaunisse médicamenteuse (hépatite toxique provoquée par l'action d'un médicament). Ces symptômes ont disparu ou régressé aussitôt que la prise du produit a été cessée. Dans de très rares cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même plusieurs jours après l'utilisation. Dans certains rares cas, des réactions d'hypersensibilité sont possibles chez les personnes ayant une hypersensibilité aux plantes de la famille des composées (Arnica).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (2,0 ml) par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (2,0 ml chaque).

Zeel[MD] comp. N

:: POMMADE *DIN-HM 80007778*

Composition : 100 g cont. : Arnica montana D2 300 mg, Rhus toxicodendron D2 270 mg, Sanguinaria canadensis D2 225 mg, Dulcamara D2 75 mg, Sulfur D6 270 mg.

Indications : préparation homéopathique pour soulager la douleur associée aux conditions arthritiques et / ou arthrosiques.

Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica et à l'herbe à puce.

Effets secondaires : dans certains cas individuels, des réactions d'hypersensibilité sont possibles chez les personnes ayant une hypersensibilité aux plantes de la famille des composées (Arnica).

Mentions de risque : pour usage externe seulement. Ne pas appliquer sur des écorchures et éraflures ou directement sur des plaies ouvertes. L'alcool cétolstéaryle peut causer une réaction cutanée locale (ex. dermite de contact).

Mode d'emploi : adultes et enfants de plus de 6 ans, appliquer généreusement sur les régions affectées matin et soir, ou plus souvent si nécessaire et masser doucement. Au besoin, appliquer un pansement.

Présentation : tube de 50 g.

Zeel[MD] comp. N

:: COMPRIMÉS *DIN-HM 80007363*

Composition : 1 comprimé cont. : Rhus toxicodendron D2 1,0 mg, Arnica montana D2 0,5 mg, Dulcamara D2 0,3 mg, Sanguinaria canadensis D4 0,45 mg, Sulfur D6 0,75 mg.

Indications : préparation homéopathique pour soulager la douleur associée aux conditions arthritiques et / ou arthrosiques.

Contre-indications : hypersensibilité à l'Arnica et à l'herbe à puce. En raison de son contenu en Sanguinaria canadensis (sanguinaire), ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement. Dans les cas de patients souffrant, ou ayant déjà souffert d'une maladie hépatique ou si utilisé conjointement avec des médicaments hépatotoxiques, prendre seulement après avoir consulté un praticien en soins de santé.

Effets secondaires : durant un traitement par des produits contenant des alcaloïdes de Sanguinaria canadensis (sanguinaire du Canada), certains cas rapportent des taux d'enzymes hépatiques élevés (transaminases) et une augmentation de la bilirubine sérique, au point d'induire une jaunisse médicamenteuse (hépatite toxique provoquée par l'action d'un médicament). Ces symptômes ont disparu ou régressé aussitôt que la prise du produit a été cessée. Dans de très rares cas, des désordres gastro-intestinaux ou des réactions cutanées peuvent se produire, même plusieurs jours après l'utilisation. Dans certains rares cas individuels, des réactions d'hypersensibilité sont possibles chez les personnes ayant une hypersensibilité aux plantes de la famille des composées (Arnica).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 comprimé 3 à 5 fois par jour.

Présentations : emballages de 50 ou 250 comprimés.

Retrouvez votre sérénité

Prenez contrôle de votre anxiété • Rétablissez votre cycle de sommeil profond

Nervoheel[MD] aide à soulager la nervosité, l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, l'appréhension et les sautes d'humeur. Il a été démontré cliniquement que son efficacité est aussi grande que celle des médicaments conventionnels, sans engendrer les effets secondaires associés à ceux-ci.

Neurexan[MD] améliore la qualité du sommeil en traitant les problèmes liés à l'insomnie. La prédisposition naturelle du corps au sommeil sera rétablie pour garantir des cycles de sommeil reposants et profonds.

Quelques produits complémentaires pour le stress et le sommeil :

- Ignatia-Homaccord[MD]
- Selenium-Homaccord[MD]
- Neuro-Heel[MD]
- Valerianaheel[MD]
- Tonico-Heel[MD]
- Detox-Kit[MD]

www.heel.ca

-Heel

2 Préparations Injeel[MD] et Injeel[MD] forte – Médicaments unitaires homéopathiques en accords de dynamisation

Acidum fumaricum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80019372*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Fumaricum acidum D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : catalyseur d'une extrême importance (faisant partie du cycle de l'acide citrique). Le patient habituel est généralement pâle et d'apparence malsaine, boursouflé et à court de souffle, avec un teint bleuâtre au visage, aux cheveux gras avec une forte tendance à la transpiration ainsi qu'une fonction rénale diminuée. Rhumes avec écoulements catarrhaux, sécrétions qui brûlent, enflement des paupières; fièvre des foins. Aussi pour les perturbations enzymatiques au niveau des organes digestifs, maladies inflammatoires des organes génitaux (ovarite, paramétrite avec sensation de prolapsus); inconforts climatériques (bouffées de chaleur et périodes de transpiration intense).
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Acidum L(+) lacticum-Injeel[MD] forte

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80011885*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Sarcolacticum acidum D4, D12, D30, D200 275 mg chaque.
Indications : désordres de la respiration cellulaire, également un traitement adjuvant dans le diabète sucré; de plus, dans les conditions précancéreuses et les phases néoplasiques.
Mentions de risque : pour un usage prolongé, consultez un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Acidum succinicum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80020631*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Succinicum acidum D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : étroitement lié au système hématologique : anémie, leucémie et aussi les maux de tête anémiques, suite à une perte de sang et dans les conditions d'épuisement. Estomac nerveux et irritable. Infections chroniques et récurrentes du bassinet du rein et des voies urinaires efférentes. Les patients sont inhibés, fatigués, avec une mémoire défaillante.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Acidum Alpha-Ketoglutaricum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80019936*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Alpha-ketoglutaricum acidum D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : affecte les tissus musculaires et conjonctifs; l'épuisement accompagné de douleur sont des traits typiques. Utilisé pour le traitement des douleurs et blessures au niveau de l'appareil musculaire et ligamentaire; rhumatismes dans les tissus mous; tendovaginites. Aussi indiqué pour les sensations de faiblesse lors d'infections de type grippale. La constitution caractéristique est celle des types minces, musclés et sportifs, ils ont besoin que les fenêtres demeurent ouvertes en tout temps et leur condition s'aggrave lorsqu'ils demeurent assis ou au volant d'un véhicule.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Antimonium crudum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80002825*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Stibium sulfuratum nigrum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : gastrites (langue enrobée d'une substance blanche-crayeuse); kératoses (en particulier de la plante des pieds); rhagades; verrues; exanthèmes avec croûtes jaunes; désordres aggravés lors d'un bain froid, mais aussi avec la chaleur; le patient est agité et maussade toute la journée.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Argentum nitricum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004548*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Argentum nitricum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : mélancolie, pertes de mémoire, agoraphobie, douleurs térébrantes, maux de tête améliorés par un bandage serré; pharyngite, laryngite, enrouement, conjonctivite, gastrite, ulcères d'estomac, hémorragies gastriques; énurésie; désir prononcé pour les sucreries.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Arnica-Injeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004636*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Arnica montana D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : stimulation de la cicatrisation des plaies; fractures, luxations, contusions, hématomes, faiblesse du myocarde, accident vasculaire cérébral, névralgies, myalgies, aggravation de l'état par le contact et le mouvement, sensation de faiblesse.

Effets secondaires : dans des cas individuels, des réactions d'hypersensibilité sont possibles chez les personnes ayant une hypersensibilité aux composées (Arnica).
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Arsenicum album-Injeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007308*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Arsenicum album D12, D30, D200, D1000 275 mg chaque.
Indications : toujours indiqué lorsque l'épuisement, l'agitation, l'anxiété et la dépression dominent le tableau clinique. À plus grande échelle, Arsenicum album-Injeel[MD] S est indiqué dans les troubles s'aggravant vers minuit, lors de sensations de brûlure; un besoin de chaleur, la crainte de ne jamais retrouver la santé; écoulements âcres, brûlements en présence de coryza, diarrhée, gastrite, soif insatiable (ne boit qu'à petites gorgées un peu d'eau tiède); émaciation, eczéma, dermatite, urticaire avec sensation de brûlure, prurit, agitation, acné, psoriasis, pityriasis; lichen plan, glomérulonéphrite; lithiase rénale, notamment dans les coliques du côté droit, arythmie chronique, myocardite, anasarque, conjonctivite, maux de tête.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Bryonia-Injeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007595*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Bryonia D12, D30, D200, D1000 275 mg chaque.
Indications : indiqué dans toutes les conditions d'inflammation des membranes séreuses, rhumatismes inflammatoires, hypertrophie du foie avec langue blanche et grande soif (pour l'eau ou la bière froide); pour des troubles (surtout du côté droit), s'aggravant avec le mouvement, la colère ou après le repas mais améliorés par le repos et la pression, ainsi que lorsque couché sur le côté affecté.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

cAMP D8, cAMP D12, cAMP D30

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004777*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Adenosinum cyclophosphoricum D8 (ou D12, ou D30, selon le cas) 1,1 g.
Indications : pour la réactivation au niveau des blocages enzymatiques (les enzymes de la membrane cellulaire telle que l'adénylate cyclase), les phases cellulaires, dommages iatrogènes, peut être expérimenté dans les maladies virales et comme traitement d'appoint dans le cancer.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Cartilago suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80019493*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Cartilago suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : indiqué dans les cas de maladies du cartilage, tendovaginite coxite, périarthrite, huméroscapularis (syndrome de la coiffe des rotateurs), et l'arthrose déformante.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Cocculus-Injeel[MD] forte

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 02058014*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Cocculus D6, D12, D30, D200, D1000 220 mg chaque.
Indications : cinétoses, la sensation de vide et de creux; très grande lassitude et faiblesse générale; brachialgie paresthésique nocturne; les troubles changent de côté.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Conium-Injeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004292*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Conium maculatum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : étourdissements à chaque changement de position; strangurie, irritation due à la toux, comme si elle résultait d'une zone sèche dans le larynx, défaillances de la mémoire; faiblesse accompagnée de tremblements; troubles de la parole, troubles de coordination des membres (ataxie); paralysies ascendantes; indurations et nodules durs comme la pierre; phases néoplasiques, préparation pour les conditions gériatriques.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).

Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Cortison-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80002261*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Cortisone aceticum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : a une action particulière d'inverser l'effet des glucocorticoïdes. Conséquences de l'utilisation abusive de la cortisone, et autres dommages thérapeutiques. Détérioration du cortex de la glande surrénale, l'hypophyse (en particulier du lobe antérieur comme dans le syndrome de Sheehanet la dystrophie adipogénitale), faiblesse ou dommage aux tissus conjonctifs, par ex. ostéoporose, ostéomalacie, ostéochondrose, faiblesse des ligaments avec entorses des articulations. SDSC (syndrome douloureux régional complexe ou atrophie de Sudeck) et autres maladies qui se manifestent dans les tissus conjonctifs.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Funiculus umbilicalis suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004145*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Funiculus umbilicalis suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : préparation pour les affections du tissu conjonctif; indiqué dans presque toutes les maladies chroniques. Tissus conjonctifs endommagés, adhérences, ostéochondrose, vieillissement prématuré, formation de rides, adynamie, artériosclérose, syndrome cervical, coxite, diverticulites, colite chronique, lupus erythémateux, maladies du collagène, sclérodermie, fibromes, troubles vasculaires, indication gériatrique de toutes sortes, glaucome, troubles circulatoires, dystonie végétative, lésions suite à l'irradiation, ulcères duodénaux et

ventriculaires, prurit psoriasique de la vulve, sarcome et carcinome, maladies auto-agressives, dommages dus à l'antibiothérapie et aux traitements thérapeutiques généraux, lymphadénopathie bénigne, otosclérose, sclérose en plaques, atrophie musculaire, névralgies intervertébrales, névrodermite, œdème, marasme, cachexie, lymphogranulomatose, myopie, acné rosacée, décubitus, dermatite, dystrophie adiposogénitale, éléphantiasis, emphysème, exostose, cirrhose du foie, ténosynovite, hydrocèle, préparation auxiliaire pour la myxœdème, rétrécissement de l'urètre, fissure anale, prolapsus de l'utérus, érythème exsudatif multiforme et nodosum, spondylarthrite ankylosante, myosite ossifiante, ostéomalacie.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Glandula suprarenalis suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004301*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Glandula suprarenalis suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : adynamie, asthme bronchique, états d'épuisement, maladie d'Addison et autres symptômes associés à l'épuisement des glandes surrénales; polyarthite primaire chronique, hypotonie, vagotonie, névrodermite, rhagades, colite muqueuse, spasmophilie après des brûlures; préparation gériatrique.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Hepar suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004020*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Hepar suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : foie endommagé et détoxication hépatique déficiente, eczéma chronique, dermatite atopique, psoriasis, érythématose, porphyrie; aussi dermatomycose, pemphigus et kraurosis vulvae, infertilité masculine, syndrome d'irradiation aiguë, hypoglycémie, anorexie nerveuse; fréquemment indiqué comme traitement intermédiaire dans les phases cellulaires. Pour stimuler la fonction de détoxication hépatique; également indiqué pour l'arthrose déformante et la périarthrite huméroscapulaire.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Histamin-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM à venir*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Histaminum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : tous les tableaux cliniques, les symptômes, les conditions, etc. pour lesquels l'action excessive d'histamine peut être tenue responsable : dans les maladies allergiques telles que l'asthme bronchique, la rhinite vasomotrice, les maladies allergiques de la peau; également gastrites et duodénites avec ou sans ulcération; spasmes gastro-intestinaux, augmentation de la sécrétion des glandes salivaires et lacrymales, ainsi que des glandes bronchiques; certaines formes de céphalées. Puisque l'histamine est également contenue dans de nombreuses boissons alcoolisées, Histamin-Injeel[MD] est indiqué expérimentalement pour de nombreux troubles découlant de l'alcool. Puisque l'histamine est aussi libérée en grande quantité lors de brûlures, contusions, fractures ou de destruction des tissus, Histamin-Injeel[MD] est pareillement indiqué pour ces traumatismes.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Hypothalamus suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80003119*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Hypothalamus D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : troubles du sommeil, maladie de Parkinson, conditions épileptiformes, troubles de la croissance et de la maturation, y compris ceux de nature mentale chez les enfants; chorée mineure, nymphomanie, états d'excitation, maladie de Simmonds.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Kalium bichromicum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007360*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Kalium bichromicum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : ulcères profonds, à l'emporte-pièce; sécrétions visqueuses et filandreuses de toutes les muqueuses; catarrhes chroniques du nez, de l'oreille moyenne, des conduits de l'oreille; (poly) sinusite, stomatite aphteuse et particulièrement ulcéreuse; aggravation avec la consommation de bière, tandis que d'autres boissons alcoolisées sont mieux tolérées.
Effets secondaires : des réactions cutanées peuvent se produire dans certains cas individuels. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Lachesis-Injeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80006839*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Lachesis mutus D12, D30, D200, D1000 275 mg chaque.
Indications : inattention à l'aggravation de sa condition; troubles s'aggravant à la chaleur du soleil; le patient est loquace, méfiant et croit qu'il est en train de se faire empoisonner; bouffées de chaleur avec sensation que les vêtements sont trop serrés; la langue tremble lorsqu'elle est tirée; visage jaunâtre strié de veinules rouges; sensation de boule dans la gorge, angine amygdalienne; enflure rouge-bleutée. Préparation pour les affections du côté gauche. Inflammation et hémorragies de la peau et des muqueuses; symptômes de la ménopause, maladies glandulaires, maladies infectieuses et empoisonnement de sang général; phlébite; angine de poitrine, insuffisance cardiaque et circulatoire; névralgies; rhumatismes, conditions spasmodiques, paralysie, troubles du comportement; discorde émotif ou bouleversement.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Magnesium manganum phosphoricum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80002789*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Magnesium phosphoricum D12, D30, D200, Manganum phosphoricum D12, D30, D200 183 mg chaque.
Indications : utilisé principalement pour l'action catalytique des oligo-éléments, en particulier pour soutenir le cycle de l'acide citrique.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Medorrhinum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80013673*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Medorrhinum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : de manière précipitée, malaise et agitation, nervosité excessive et épuisement, sensibilité aux courants d'air, pessimisme, dépression mentale, obstinance et autres perturbations caractérielles, tendance à la manie. Maux de tête frontaux avec sensation de constriction, insomnie aux alentours de minuit; peut également être indiqué pour l'énurésie nocturne. Grand oubli (des événements récents), le patient perd la suite de ses idées quand il parle. Rhinites et sinusites avec obstruction nasale et une anosmie. Toux sèche douloureuse s'aggravant la nuit. Laryngo-spasmes et asthme s'améliorant au bord de la mer. Envie de stimulants et de sucreries, ainsi que de glace, bière et sel. Douleurs abdominales spasmodiques, constipation avec selles difficiles à évacuer. Colique néphrétique, cystite et urétrite, fluor albus (muguet), prurit des organes reproducteurs; seins féminins froids comme la glace et marbrés, sensible au toucher. Troubles rhumatismaux (mono arthrite), arthrose du genou et de la hanche, et aussi la déformation des articulations digitales et radio-carpiennes. Chaleur brûlante et douleurs dans les mains et la plante des pieds, sensibilité dans les talons; apparition et cessation brusque des douleurs névralgiques.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois). Utiliser selon les recommandations d'un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus) et enfants (1 à 11 ans), 1 ampoule (1,1 ml) 1 à 3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Medulla ossis suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80011403*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Medulla ossis suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : anémie, leucémie, agranulocytose et autres dommages thérapeutiques, dommages des suites de l'irradiation, coxite, ostéomalacie, ostéomyélite chronique, exostose, arthrite déformante, SDSC (syndrome douloureux régional complexe ou atrophie de Sudeck).
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Natrium oxalaceticum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80021998*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Natrum oxalaceticum D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : une indication importante est celle de la susceptibilité aux rhumes et de l'hypersensibilité à l'albumine et au gras dans l'alimentation, aussi au vent et à l'humidité. Étourdissements qui résistent à la thérapie. Avant et suite à un infarctus cérébral. Augmentation de la pression artérielle. Gastrite aiguë et chronique. Maladies inflammatoires des reins et du bassinet du rein. Transpiration sévère jour et nuit menant à un jaunissement des sous-vêtements. La transpiration dégage une odeur d'ammoniaque et l'urine une odeur d'asperges.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Natrium pyruvicum-Injeel[MD] forte

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80013122*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Natrum pyruvicum D6, D10, D30, D200 275 mg chaque.
Indications : similitudes avec les symptômes du soufre. Indiqué dans les phases cellulaires de tous genres, dont l'asthme, l'eczéma prurigineux, le psoriasis, manifestations rhumatismales de la goutte, maladies nerveuses organiques, états précancéreux et dans les phases néoplasiques. Migraines, survenant dans la matinée, durant jusqu'au coucher du soleil, accompagnées de nausées et de sentiments de désespoir. Troubles de la circulation associés au diabète.
Mentions de risque : utiliser selon les recommandations d'un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) 1 à 3 fois par semaine. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) par jour durant 3 jours, et ensuite poursuivre avec le dosage général.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Nux vomica-Injeel[MD] S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80004776*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Nux vomica D12, D30, D200, D1000 275 mg chaque.
Indications : préparation gastro-intestinale et hépatique, conséquences de l'abus de stimulants (alcool, nicotine), constipation spasmodique, hémorroïdes, le patient est irrité, agacé, facilement en colère et hypersensible aux influences extérieures; état nettement aggravé le matin. Aussi les maladies des voies urinaires; troubles circulatoires, vertiges, symptômes ressemblant à ceux de l'angine de poitrine, crampes musculaires, paralysie, hyperexcitabilité.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Pankreas suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80007625*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Pancreas suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : diabète sucré (d'origine pancréatique), dysbiose, marasme, cachexie, entérite chronique, duodénite, dérangements de la fermentation intestinale, adynamie, syndrome gastro-cardiaque.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux bébés (0 à 2 ans).
Mode d'emploi : adultes, 12 ans et plus, en général, 1 ampoule (1,1 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Phytolacca-Injeel[MD] forte S

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80006248*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Phytolacca D4, D12, D30, D200 275 mg chaque.
Indications : amygdalite avec anneau lymphoïde de Waldeyer enflammé, rouge foncé; rhumatisme articulaire aigu, mastite.

Contre-indications : consultez un praticien en soins de santé avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Placenta suis-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM à venir*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Placenta suis D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : troubles circulatoires périphériques, cutis marmorata, escarres de décubitus, Maladie de Bürger, ulcères cruraux, rhagades, eczéma, sclérodermie, engelures, dysménorrhée, spasmes suraux, rhumatismes musculaires et troubles de la démarche.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Sinusitisinum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80014500*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Sinusitisinum D10, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : inflammation ou suppuration aiguë, chronique et surtout chroniquement récurrente des sinus paranasaux, adénoïdes, lymphatisme, rhume des foins et autres allergies ou troubles de type vasomoteurs associés à la rhinite et à la sinusite; syndrome sino-bronchique. Traitement auxiliaire de la rhinite chronique avec une tendance à l'ozène; également indiqué dans les maladies qui peuvent entraîner une influence réflexe sur la muqueuse nasale, par ex. asthme réflexe, ulcères de l'estomac ou du duodénum, névralgies, etc. Indiqué avantageusement avec Euphorbium compositum[MD] ainsi qu'en association avec Mucosa compositum dans les cas éminemment chroniques, ainsi qu'ayant une tendance à l'ozène; aussi avec Graphites-Homaccord[MD] pour les adénoïdes et polypes nasaux.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus) et enfants (1 à 11 ans), 1 ampoule (1,1 ml) 1 à 3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Spongia-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80006252*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Spongia D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : toux sèche, semblable à celle de la croupe; laryngite, gonflement ganglionnaire, goitre colloïde et parenchymateux, lésions du myocarde, myocardite, palpitations, orchite, épididymite.
Contre-indications : ne pas utiliser dans les cas de maladies thyroïdiennes sans un avis médical.
Mentions de risque : le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 11 ans), en général, ⅔ ampoule (0,7 ml) par jour. Dans les cas aigus, ⅔ ampoule (0,7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (1 à 5 ans), en général, ½ ampoule (0,5 ml) par jour. Dans les cas aigus, ½ ampoule (0,5 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Staphylococcus-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80013674*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Staphylococcinum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : maladies chroniques et chroniquement récurrentes dans lesquelles les staphylocoques, possiblement sous forme d'une infection mixte ou secondaire par ex. furoncles, anthrax, panaris pulpaire, impétigo, blépharite, orgelets, acné vulgaris ou conglobata, ulcères variqueux, pyodermite chronique des papilles et ulcérations, ostéomyélite, changements phlegmoneux, otite moyenne, cystopyélite, pneumonie, entérocolite, myélite, etc. Généralement, dans les phases retoxiques basées sur des dommages par des toxines staphylococciques, par ex. troubles d'auto-agression ainsi que les tableaux cliniques où les maladies ci-dessus se trouvent dans l'anamnèse. Staphylococcus-Injeel[MD] peut également être administré avec de bons résultats dans les cas d'insuffisance du myocarde, du foie, des reins et du tissu conjonctif, ainsi que dans les troubles thyroïdiens. Particulièrement efficace en association avec Streptococcus haemolyticus-Injeel[MD]
Mentions de risque : utiliser sous la supervision d'un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus) et enfants (1 à 11 ans), 1 ampoule (1,1 ml) 1 à 3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Streptococcus haemolyticus-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80014594*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Streptococcinum D12, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : amygdalite (souvent avec une tendance vers des abcès amygdaliens), otite moyenne, phlegmons, empyème, mastites puerpérales, endocardite, myocardite, péricardite, pneumonie, méningite, ostéomyélite, polyarthrite primaire chronique, tics choréoformiques, tics grimaçants, hypertension musculaire; changements mentaux tels qu'impulsions faibles, inattention, chaleur étouffante, irritabilité, dépression, tendances psychotiques, psychoses hallucinatoires, cauchemars, piétinements. Au niveau symptomatique, il y a une intolérance au bruit, à la lumière et aux courants d'air, ainsi qu'une tendance à pleurer sans cause, à la soumission, à une sensation de vibration de la colonne vertébrale lorsque couchée et étirée, ainsi que des bourdonnements d'oreille et un sentiment de lèvres salées. Devrait toujours être incluse dans le traitement des maladies auto-immunes, en particulier quand on soupçonne que les streptocoques sont impliqués dans la pathogenèse. Particulièrement efficace en association avec Staphylococcus-Injeel[MD].
Mentions de risque : utiliser sous la supervision d'un praticien en soins de santé. Le suivi d'un médecin est nécessaire avant d'administrer aux nourrissons (0 à 12 mois).
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus) et enfants (1 à 11 ans), 1 ampoule (1,1 ml) 1 à 3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Vaccininum-Injeel[MD]

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80012940*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Vaccinotoxinum D20, D30, D200 367 mg chaque.
Indications : séquelles et réactions trop fortes après la vaccination contre la variole, par exemple. De plus, pour les maux de tête, dépression exogène, conjonctivite, blépharite, iritis, rhinite purulente, ainsi que pour la polyarthrite rhumatismale, parésie, néphrites post-vaccinales avec albuminurie et hématurie; aussi, pour métrorrhagie, varicelle et tout particulièrement le zona et l'herpes simplex. Aussi pour l'érysipèle, phlegmons et eczéma aigu; de même que pour les douleurs précordiales, la paracentèse thoracique, la perte d'appétit et le dégoût à la vue et l'odeur de la nourriture (Julian). En général, pour les niveaux toxiques graves et pour les maladies septiques (en association avec Traumeel[MD] S et Lachesis-Injeel[MD] S). Expérimentalement pour les aphtes (avec Engystol[MD], peut-être aussi avec Mucosa compositum).
Mentions de risque : utiliser selon les recommandations d'un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), 1 ampoule (1,1 ml) 1 à 3 fois par semaine.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Viscum album-Injeel[MD] forte

:: AMPOULES BUVABLES STÉRILES *DIN-HM 80011715*
Composition : 1 ampoule (1,1 ml) cont. : Viscum album D3, D12, D30, D200 275 mg chaque.
Indications : attaques soudaines d'étourdissements, maux de tête, surtout au niveau frontal; hypertension, prurit sine materia, état précancéreux et néoplasiques.
Contraindications : les produits contenant l'ingrédient Viscum album ne doivent pas être utilisés chez les personnes ayant une allergie connue au gui, dans les cas de granulomatoses chroniques et de maladies auto-immunes, et dans les cas d'hyperthyroïdie accompagnée d'un déséquilibre métabolique. Dans les conditions inflammatoires aiguës et fiévreuses, discontinuer le traitement jusqu'à disparition de l'inflammation et de la fièvre.
Effets secondaires : dans de très rare cas, des réactions allergiques peuvent se produire.
Mentions de risque : pour une utilisation prolongée, consulter un praticien en soins de santé.
Mode d'emploi : adultes (12 ans et plus), en général, 1 ampoule (1,1 ml) par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1,1 ml) jusqu'à 3 fois par jour.
Présentation : emballage de 10 ampoules (1,1 ml chaque).

Améliorez la digestion

Soulagez les crampes et les spasmes

Supportez votre système gastro-intestinal et votre foie • Soulagez les crampes et spasmes

Nux vomica-Homaccord[MD] soulage les malaises gastro-intestinaux, notamment l'indigestion, la nausée, les ballonnements et la constipation, tout en favorisant le processus de détoxification du foie.

Spascupreel[MD] procure un soulagement rapide des crampes douloureuses telles que les crampes musculaires, les spasmes gastro-intestinaux, les crampes et les spasmes liés au cycle menstruel.

Quelques produits complémentaires pour la digestion, crampes et spasmes :

- Gastricumeel[MD]
- Veratrum-Homaccord[MD]
- Diarrheel[MD]
- Hepeel[MD]
- Detox-Kit[MD]

www.heel.ca

-Heel

Index : **PRODUITS**

D

A
Acidum fumaricum-Injeel[MD] 127
Acidum L(+) lacticum-Injeel[MD] forte 127
Acidum succinicum-Injeel[MD] 128
Acidum Alpha-Ketoglutaricum-Injeel[MD] 128
Aesculus compositum 51-52
Aesculus-Heel[MD] 52
Aletris-Heel[MD] 53
Angin-Heel[MD] SD 53
Antimonium crudum-Injeel[MD] 129
Apis-Homaccord[MD] (Ampoules buvables stériles) 54
Apis-Homaccord[MD] (Gouttes) 54
Argentum nitricum-Injeel[MD] 129
Arnica-Heel[MD] 55
Arnica-Injeel[MD] S 129-130
Arsenicum album-Injeel[MD] S 130

B
Barijodeel 55
Belladonna-Homaccord[MD] 56
Berberis-Homaccord[MD] (Ampoules buvables stériles) 56
Berberis-Homaccord[MD] (Gouttes) 57
Brocosin[MD] 57
Bronchalis-Heel[MD] 58
Bryaconeel 58
Bryonia-Injeel[MD] S 131

C
Calcoheel 58-59
cAMP D8, cAMP D12, cAMP D30 131
Cantharis compositum S 59
Cardi-Heel[MD] 59-60
Cartilago suis-Injeel[MD] 132
Causticum compositum (Ampoules buvables stériles) 60
Causticum compositum (Gouttes) 61
Ceanothus-Homaccord[MD] 61
Cerebrum compositum 62
Chelidonium-Homaccord[MD] N (Ampoules buvables stériles) 62-63
Chelidonium-Homaccord[MD] N (Gouttes) 63
China-Homaccord[MD] S 63-64
Cimicifuga-Homaccord[MD] 64
Circulo-Injeel[MD] N 64-65
Cocculus-Homaccord[MD] 65
Cocculus-Injeel[MD] forte 132
Colchicum compositum 65
Colocynthis-Homaccord[MD] 67
Conium-Injeel[MD] S 132-133
Cortison-Injeel[MD] 133
Cralonin[MD] 67
Cruroheel S 68

D
Detox-Kit[MD] 68
Diarrheel SN 69
Droperteel 69
Drosera-Homaccord[MD] 70
Duodenoheel 70

E
Echinacea comp.-Heel 71
Echinacea compositum 71-72
Engystol[MD] (Ampoules buvables stériles) 72
Engystol[MD] (Comprimés) 73
Euphorbium comp.[MD] SN (Gouttes) 73
Euphorbium comp.[MD] 74
Euphorbium comp.[MD] SN (Vaporisateur nasal) 74

F
Ferrum-Homaccord[MD] 75
Funiculus umbilicalis suis-Injeel[MD] 133-134

G
Galium-Heel[MD] S 75
Gastricumeel[MD] 76
Gelsemium-Homaccord[MD] (Ampoules buvables stériles) 76
Gelsemium-Homaccord[MD] (Gouttes) 77
Glandula suprarenalis suis-Injeel[MD] 134
Glyoxal compositum 77
Graphites-Homaccord[MD] 77-78
Gripp-Heel[MD] (Ampoules buvables stériles) 78
Gripp-Heel[MD] (Comprimés) 78-79
Gynäcoheel N 79

H
Hamamelis-Homaccord[MD] 79
Hepar comp. Heel[MD] 80
Hepar suis-Injeel[MD] 135
Hepeel[MD] N (Ampoules buvables stériles) 80-81
Hepeel[MD] N (Comprimés) 81
Histamin-Injeel[MD] 135
Hormeel[MD] SN (Ampoules buvables stériles) 81
Hormeel[MD] SNT (Gouttes) 81-82
Husteel[MD] 82
Hypothalamus suis-Injeel[MD] 136

I
Ignatia-Homaccord[MD] (Ampoules buvables stériles) 82
Ignatia-Homaccord[MD] (Gouttes) 84
Injeel[MD]-Chol 84-85

K
Kalium bichromicum-Injeel[MD] 136
Kalmia compositum (Ampoules buvables stériles) 85
Kalmia compositum (Gouttes) 85
Klimakt-Heel[MD] T 86

L
Lachesis-Injeel[MD] S 137
Leptandra compositum (Ampoules buvables stériles)..... 86
Leptandra compositum (Gouttes) 86-87
Lithiumeel 87
Luffeel[MD] (Vaporisateur nasal) 88
Luffeel[MD] (Comprimés) 88-89
Lyphosot[MD] (Gouttes) 89
Lyphosot[MD] (Comprimés)..... 89-90

M
Magnesium manganum phosphoricum-Injeel[MD] 137
Medorrhinum-Injeel[MD] 138
Medulla ossis suis-Injeel[MD] 138
Melilotus-Homaccord[MD] 90
Mercurius-Heel[MD] S 90-91
Metro-Adnex-Injeel[MD] 91
Mezereum-Homaccord[MD] 91-92
Momordica compositum N 92
Mucosa comp.-Heel[MD] (Ampoules buvables stériles)..... 92-93
Mucosa comp.-Heel[MD] (Comprimés) 93-94

N
Naso-Heel[MD] SNT 94
Natrium oxalaceticum-Injeel[MD] 139
Natrium pyruvicum-Injeel[MD] forte 139
Neralgo-Rhem-Injeel[MD] 94
Nervoheel N 95
Neurexan[MD] (Gouttes)..... 95
Neurexan[MD] (Comprimés)..... 97
Neuro-Heel[MD] 97
Nux vomica-Homaccord[MD] (Ampoules buvables stériles) 98
Nux vomica-Homaccord[MD] (Gouttes) 98
Nux vomica-Injeel[MD] S 140

O
Oculoheel[MD] (Gouttes oculaires) 99
Oculoheel[MD] (Comprimés) 99
Osteoheel S 100

P
Paeonia comp.-Heel[MD] 100
Pankreas suis-Injeel[MD] 140
Phosphor-Homaccord[MD] 100-101
Phytolacca-Injeel[MD] forte S 140-141
Placenta suis-Injeel[MD] 141
Plantago-Homaccord[MD] 101
Podophyllum compositum (Ampoules buvables stériles).. 101-102
Podophyllum compositum (Gouttes) 102
Pulsatilla compositum 102-103
Pulsatilla compositum E 103

R
Ranunculus-Homaccord[MD] 103-104
Reneel NT 104
Rheuma-Heel[MD] 104-105
Rhododendroneel SN 105

S
Sabal-Homaccord[MD] 105-106
Schwef-Heel[MD] 106
Selenium-Homaccord[MD] 106
Sinusitisinum-Injeel[MD] 141
Spascupreel[MD] (Ampoules buvables stériles)..... 108
Spascupreel[MD] (Comprimés) 108-109
Spigelon[MD] (Gouttes) 109
Spigelon[MD] (Comprimés) 109
Spongia-Injeel[MD] 142
Staphylococcus-Injeel[MD] 142
Streptococcus haemolyticus-Injeel[MD] 143
Strumeel forte N 110
Strumeel T 110
Sulfur-Heel[MD] 111

T
Tartephedreel[MD] N 111
Tonico-Injeel[MD] 112
Traumeel[MD] S (Ampoules buvables stériles) 112-113
Traumeel[MD] S (Gouttes) 113-114
Traumeel[MD] S (Gouttes otiques) 114
Traumeel[MD] S (Gel) 115
Traumeel[MD] S (Pommade) 115-116
Traumeel[MD] S (Comprimés) 116

U
Ubicoenzyme 117

V
Vaccininum-Injeel[MD] 143
Valerianaheel 117
Veratrum-Homaccord[MD] 119
Vertigoheel[MD] (Ampoules buvables stériles)..... 119
Vertigoheel[MD] (Gouttes) 119-120
Vertigoheel[MD] (Comprimés) 120
Viburcol[MD] monodoses 120-121
Viburcol[MD] N 121
Vinceel[MD] 121-122
Viscum album-Injeel[MD] forte 144
Viscum compositum forte 122
Viscum compositum medium 123
Vomitusheel 123

Y
Ypsiloheel N 124

Z
Zeel[MD] comp. N (Ampoules buvables stériles) 124
Zeel[MD] comp. N (Pommade) 125
Zeel[MD] comp. N (Comprimés) 125

Heel Canada Inc.
11025 L.-H. Lafontaine
Montréal, Québec
Canada, H1J 2Z4

-Heel